

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

第3類医薬品

滋養強壮剤

エナックW

製品の特徴

エナックWは、

- 植物性生薬のエゾウコギ、リュウガンニク、ブクリョウに、不足しがちな4種類のビタミン（ビタミンB₆・B₂、ニコチン酸アミド、ビタミンC）を配合した滋養強壮剤です。
- 肉体疲労時、病中病後、偏食児などの場合の栄養補給に効果をあらわします。
- 5才のお子様から服用いただけます。

ご家族皆様の健康維持に、エナックWをぜひお役立てください。



使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感

2. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

3. しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

大人(15才以上)の場合

- 滋養強壮 ●虚弱体質 ●肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

小児(5才以上15才未満)の場合

- 滋養強壮 ●虚弱体質 ●小児の発育期・偏食児・胃腸障害・栄養障害・病中病後・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給

用法・用量

1 回下記量を水又はお湯と一緒に服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人(15才以上)	3 錠	3 回
8才以上15才未満	2 錠	
5才以上8才未満	1 錠	
5才未満	服用させないでください	

<用法・用量に関する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分とはたらき

成 分	分量(9錠中)	は た ら き
エゾウコギエキス	280mg (エゾウコギとして4g)	ウコギ科エゾウコギの根茎で、シベリアニンジンとも呼ばれ、薬用ニンジンと同様、すぐれた抗疲労作用が報告されています。ロシアではエレウテロコック、中国では刺五加、五加参などの名で知られています。
リュウガンニクエキス	90mg (竜眼肉として300mg)	ムクロジ科リュウガンの仮種皮のエキスで、虚弱体質や、病中病後などの場合の栄養補給に用いられます。
ブクリョウ末 (茯 苓)	300mg	サルノコシカケ科マツホドの菌核で、滋養、強壮薬として用いられます。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	50mg	肉体的疲労時や偏食児、栄養障害などの場合に不足しがちなビタミンです。
リボフラビン酪酸エステル (ビタミンB ₂ 酪酸エステル)	12mg	
ニコチン酸アミド	60mg	
アスコルビン酸 (ビタミンC)	200mg	

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、含水二酸化ケイ素、カルメロースCa、ステアリン酸Mgを含有します。

<成分・分量に関する注意>

- (1) 本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これはリボフラビン酪酸エステル(ビタミンB₂酪酸エステル)によるもので、心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) ビンの詰め物は、輸送中の内容物の破損を防ぐためのものです。
開封後は不要となりますので、取りのぞいてください。
- (6) 本剤は、生薬成分を配合しているため、製品により多少色が異なることがありますが、効果に変わりはありません。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目5-1

☎03-3293-3363

受付時間 9時～12時、13時～17時(土、日、祝日を除く)



製造販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624

本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36

http://www.wakunaga.co.jp/