

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# プラセンタ製剤 オリジンP糖衣錠

第2類医薬品

オリジンP糖衣錠は、胎盤を化学的に処理してえられる加水分解物と、乾燥させた微粉末の混合物にビタミンB1類（チアミンジスルフィド）を加え服用を容易にした製剤であります。

豊富な蛋白質と吸収され易い各種アミノ酸、それにビタミンB1類を含んでおり、滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給などにすぐれた効果をあらわします。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください





- (1)本剤の服用により、かゆみ、発疹等の症状があらわれた場合、又は生理に異常を感じられた時
- (2)しばらく服用しても症状の改善がみられない場合

## 【効能】

15才以上 滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給。

5才～14才 滋養強壮、虚弱体質、病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給、偏食児・幼小児の発育期などの栄養補給。

## 【用法・用量】


年齢	15才以上	11才以上15才未満	5才以上11才未満	5才未満
1回量	3錠 	2錠 	1錠 	服用させないこと 
服用回数	1日3回			

裏面もお読みください

## 〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)本剤は5才未満の乳幼児に服用させないでください。

## 〔PTP包装の場合の錠剤の取り出し方〕



突き出た透明な部分を指先でアルミ箔の方へ押すと、アルミ箔が破れて錠剤が出てきます。

誤って、そのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながります。

## 〔成分・分量〕 本品9錠（1日量）中

胎盤加水分解物…………… 0.54mL

胎盤乾燥微粉末…………… 750mg

チアミンジスルフィド…………… 18mg

添加物として乳糖、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、アラビアゴム、ゼラチン、白糖、マクロゴール、タルク、炭酸Ca、黄色5号、赤色3号、カルナウバロウを含む。

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)箱に「開封年月日」を記入してください。  
添付文書は、箱に入れたまま保管してください。
- (5)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

日々の健康は薬だけではなく、日々の養生が大切な要因となります。規則正しい生活を守るようにしてください。

## お問い合わせ先

ビタエックス薬品工業株式会社 お客様相談室

電話：075(691)1671(代表)

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

発売元

**KU** ケーティジャパン株式会社  
大阪市天王寺区堀越町9番24号

製造販売元

**ビタエックス薬品工業株式会社**  
京都市伏見区竹田向代町7番地