

## 第2類医薬品

販売名:セラシー・リコ

▲【使用上の注意】

❌【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)  
長期連用しないこと。

■【相談すること】1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。  
(1)医師の治療を受けている人。(2)高齢者。  
(3)次の症状のある人。むくみ(4)次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病。  
2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

さらに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、三オパデー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、腕力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3.5～6日服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

製造販売元  中外医薬生産株式会社  
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

お客様相談室：0595-21-3200  
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

## 第2類医薬品

風邪などで  
熱がある時の  
栄養補給に

セラシー・リコ

DRINK

30mL

CAINZ



### 【成分・分量】

1日量(30mL×2)中  
タウリン(アミノエチルスルホン酸)2000mg、カンゾウエキス1000mg、ニンジンエキス80mg、ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)50mg、パンテール<sup>®</sup>30mg 添加物:果糖、ポリリン酸Na、アルギン酸Na、ロゼリン<sup>®</sup>グリコールエステル、パラベン、デヒドロ酢酸Na、エタノール、プロピレングリコール、香料

### 【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体重復、病中病後、食欲不振、栄養障害、発熱性消耗性疾患、産前産後などの場合の栄養補給

### 【用法・用量】

成人(19歳以上)1回1瓶(30mL)を1日2回服用してください。服用期間は4週間以上おいてください。○用法・用量を厳守すること。

### 【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の成分に入替えないこと(服用の原因になったの品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。本剤は注意成分を配合していますので、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

ガラス:ピン 金属:キャップ  
O1RCLCZ

製造番号

使用期限

