

そんな時の  
**栄養補給**  
**食欲がない**  
**だるい**  
**熱で体が**

発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給

**セラシー・リコ**

カンゾウエキス、ニンジンエキス、  
 タウリン配合 **30mL**

**第2類医薬品**

販売名:セラシー・リコ

**第2類医薬品**

△【使用上の注意】

☒【してはいけないこと】  
 (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)  
 長期連用しないこと

■【相対すること】 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 高齢者。 (3) 次の症状のある人。 (4) 次の診療を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病  
 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
症 状	発熱、発赤、かゆみ

また1に下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
魚アルドステロン症、 三才1才〜	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5〜6日間服用しても症状がよくなるしない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【成分・分量】 1日量 (30mL×2) 中  
 タウリン (アミノエチルスルホン酸) 2000mg、カンゾウエキス 1000mg、  
 ニンジンエキス 60mg、β-リジンキシン  
 塩酸塩 (ビタミンB6) 50mg、パ  
 シチモール 30mg、添加物: 塩酸、  
 ホリン酸Na、アルギニン酸、プロピレ  
 ングリコールエステル、パラベン、  
 アビドロ酢酸Na、エタノール、プロ  
 ピレングリコール、香料

【用法・用量】  
 成人 (15歳以上) 1回1瓶 (30mL) を1日2回  
 服用してください。服用間隔は4時間以上お  
 いてください。用法・用量は包装を必ず読むこと。

【保管及び取扱い上の注意】  
 (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2) 小児の  
 手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこ  
 と(該用の原因になったり品質が変わる。)。 (4) 使用期限を過ぎた  
 製品は服用しないこと。

※本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがあり  
 ます。よく振ってから服用してください。  
 副作用被害救済制度 ☎0120-149-931  
**ガラス:ビン 金属:キャップ**

製造販売元  **中外医薬生産株式会社**  
 三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

製造番号

お客様相談室: 0595-21-3200  
 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

使用期限



02RCELYA