

4 987347 202013

販売名：トッカピン100

【使用上の注意】

【相談すること】

次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること。

・しばらく服用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】

●滋養強壮●虚弱体質●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

【用法・用量】

大人(15才以上)1日1回1ビン(100mL)を服用する。

・用法及び用量を厳守すること。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

(2)小児の手の届かない所に保管すること。

(3)使用期限の過ぎた製品は服用しないこと。

製造販売元

金陽製薬株式会社

奈良県五條市住川町1420番地
TEL 0747-22-3451

第2類医薬品

ガラス：ビン、金属：キャップ



コウウ



インヨウカク



ニンジン

滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給

植物性生薬と動物性生薬のW処方

トッカピン100

タウリン2000mg

ニンジン600mg

(原生薬換算)

元氣

【成分・分量】1日量(1ビン:100mL)中
 タウリン……………2000mg
 ニンジンエキス……………54mg(ニンジン600mgに相当)
 ゴウチンキ……………0.2mL(ゴウチン2mgに相当)
 ハンピチンキ……………0.75mL(ハンピ150mgに相当)
 イカリ草エキス……………30mg(インヨウカク300mgに相当)
 チアミン塩化物塩酸塩(ビタミンB1)……………10mg
 リボフラビン(ビタミンB2)……………5mg
 ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)……………6mg
 ニコチン酸アミド……………20mg
 無水カフェイン……………50mg
 (アルコール含有0.6mL以下)

添加物としてクエン酸、DL-リンゴ酸、L-グルタミン酸Na、白糖、ブドウ糖果糖液糖、D-ソルビトール、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、香料を含有します。

・本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色になることがあります。

・生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には支障ありません。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

使用期限

Lot No.