

\* 2012年3月改訂(記載要領変更に伴う改訂)

FROMIN-ACE

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。



# フロ・ミンエース

## ビタミン含有保健薬

### 特徴

第2類医薬品

- フロ・ミンエースは、強壮作用のある3種の生薬、杜仲、人参、鹿茸をはじめとして、7種のビタミンとカルシウムを配合した滋養強壮保健薬です。
- ビタミンA・C・Eをはじめ、フルスルチアミン、ビタミンB<sub>2</sub>・B<sub>6</sub>・B<sub>12</sub>の7種のビタミンとカルシウムの補給に役立ちます。
- 吸収がよく、体内で利用されやすいビタミンB<sub>1</sub>誘導体フルスルチアミンを配合しています。
- 黄色の丸形の糖衣錠です。



### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

##### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊娠3ヵ月以内の妊娠、妊娠していると思われる人または妊娠を希望する人(妊娠3ヵ月前から妊娠3ヵ月までの間にビタミンAを1日10,000国際単位以上摂取した妊娠から生まれた児に先天異常の割合が上昇したとの報告がある。)

##### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐

##### 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

下痢

##### 4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

### 効能

- 滋養強壮
- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給
- 虚弱体质



### 用法・用量

次の量を、食後に水またはお湯で、かまずに服用すること。

年 齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	2錠	2回
15歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関する注意>  
用法・用量を厳守すること。



(裏面へ続く)

## 成 分

4錠(15歳以上の1日服用量)中

成 分		含 量
生 藥	トチュウエキス	60mg (トチュウ600mgより抽出)
	ニンジンエキス	198mg (ニンジン600mgより抽出)
	ロクジョウ末	10mg (ロクジョウの末…10mg)
ビタミン	レチノールパルミチン酸エステル(ビタミンAパルミチン酸エステル)	2,000ビタミンA単位 (2,000国際単位)
	アスコルビン酸(ビタミンC)	250mg
	d-α-トコフェロール酢酸エステル	10mg
	フルスルチアミン(ビタミンB <sub>1</sub> 誘導体)として (フルスルチアミン塩酸塩)	10mg 10.9mg
	リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB <sub>2</sub> 酪酸エステル)	10mg
	ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> )	25mg
	ヒドロキソコバラミン酢酸塩	60μg
カルシウム	リン酸水素カルシウム水和物*	43.4mg
	沈降炭酸カルシウム*	124.7mg
	(*カルシウムとして	60mg)


添加物：トウモロコシ油、ソルビタン脂肪酸エステル、安息香酸Na、デヒドロ酢酸Na、ゼラチン、白糖、無水ケイ酸、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、セルロース、タルク、アラビアゴム、酸化チタン、ビタミンB<sub>2</sub>

### <成分に関連する注意>

本剤の服用により尿が黄色くなることがあります。リボフラビン酪酸エステルによるものなので心配ありません。

### 保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4)瓶の中の詰め物は、フタをあけた後はすること(詰め物を再び瓶に入れるとき湿気を含み品質が変わるものとなる)。詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するためのものである。
- (5)本剤は、だ円形糖衣錠のため、落下などの衝撃で錠剤が破損(糖衣のかけ)が生じることがあるので、取扱いに十分注意すること(瓶の中の詰め物をすべてた後は、錠剤が衝撃を受けやすくなる)。
- (6)服用のつど瓶のフタをしっかりとしめること(吸湿し品質が変わる)。
- (7)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (8)箱と瓶の「開封年月日」記入欄に、瓶を開封した日付を記入すること。
- (9)一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内を目安になるべくすみやかに服用すること。



### [配合生薬について]

- 杜仲**：中国に自生する落葉高木で、樹の皮をするとネバネバした白い糸を引きます。生薬の杜仲はその樹の皮を乾燥したもので、中国の薬物書である「神農本草經」に収載され、中国では現代にいたるまで強壮薬として用いられてきた重要な生薬の1つです。最近、日本でも杜仲の有効成分や強壮作用などについて研究されており、その効果が認められています。
- 人參**：薬用人参の根を乾燥したもので「神農本草經」に収載され、珍重されてきた強壮薬です。幅広い作用がありますが、なかでも新陳代謝機能の低下を改善し、食欲を増し、体を丈夫にするはたらきがあります。
- 鹿茸**：マンシュウアカシカなどのまだ袋皮のとれていない急速に成長する幼角(袋角)を乾燥したものです。「神農本草經」に収載され、弱った体を補い丈夫にするはたらきがあるとされており、虚弱な体质の改善などに用いられています。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申しあげます。

武田薬品工業株式会社 ヘルスケアカンパニー 「お客様相談室」  
〒103-8668 東京都中央区日本橋二丁目12番10号 ☎0120-567087  
受付時間：9：00～17：00 (土、日、祝日を除く)

- タケダ健康サイト(パソコン用) <http://takeda-kenko.jp>
- タケダ健康モバイルサイト(携帯電話用) <http://tkdm.jp>

製造販売元  武田薬品工業株式会社

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号