

滋養強壮剤

ミネドリン

指定医薬部外品

ミネドリンは蛋白質より製した総合アミノ酸を主とし、生体内の蛋白質の代謝に重要な役割を果たしている
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB₆）やリボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB₂）、ニコチン酸ア
ミド及び糖分を配合した味の良い滋養強壮剤です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人



2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、下痢

3. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

成分及び分量

本品600mL中

総合アミノ酸液……………210mL

ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB₆）……………30mgリボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB₂）……15mg

ニコチン酸アミド……………150mg

添加物としてクエン酸、パラベン、安息香酸Na、白糖、カラメル、プロピレングリコール、グリセリン、エタノール、香料を含有します。

<成分及び分量に関連する注意>

本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがあります。

効能又は効果

滋養強壮、虚弱体質、

肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給



滋養強壮



虚弱体質

用法及び用量

大人は1回10mL（添付のコップを使用して下さい。）

小人はその半量を、それぞれ1日2～3回原液のまま又は水・牛乳等にうすめて服用して下さい。

<用法及び用量に関連する注意>

- （1）用法及び用量を厳守して下さい。（他のビタミン等を含有する製剤を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意して下さい。）
- （2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

保管及び取扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。特に夏季は冷蔵庫に保管して下さい。
- （2）小児の手の届かない所に保管して下さい。
- （3）他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- （4）使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。また、使用期限内であっても、開封後は、品質保持の点から2ヵ月以内に服用して下さい。
- （5）服用後は替えキャップの注ぎ口を清潔にして下さい。また、使用したコップは、その都度水でよく洗って下さい。

替えキャップの使用方法

- ①開封後は、金属キャップを添付の替えキャップに付け替えて使用して下さい。
- ②使用後は、替えキャップをしっかり閉じて下さい。
- ③無理な力を加えて開閉しないで下さい。
（ねじったりするとヒンジ部が切れることがあります。）
- ④液漏れ防止のためにピンを立てて保存して下さい。



■お問い合わせ先

伊丹製薬株式会社 お客様相談室 TEL 0740-22-2059

受付時間：9時から16時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元



伊丹製薬株式会社

滋賀県高島市今津町下弘部280番地