

販売名：リキゴールA

【使用上の注意】 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	胃部不快感、下痢

2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分・分量 1日量1本(30mL)中
ロクジョウ抽出液35mg(ロクジョウ10mgに相当)、タウリン1,000mg、チアミン硝化物10mg、ピリドキシン塩酸塩5mg、シアノコバラミン10 μ g、ニコチン酸アミド30mg、パントテン酸カルシウム30mg、無水カフェイン50mg、オロト酸コリン100mg 添加物:クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、白糖、D-ソルビトール、安息香酸Na、エタノール、香料、エチルパニコリン、グリセリン、パニコリン、プロピレングリコール(アルコール0.7mL以下)

用法・用量

成人(15歳以上) 1日1回1本(30mL)を服用する。●用法及び用量を厳守すること。●本剤は、まれに沈殿を生じることがある。よく振って服用すること。

30mL

金属：キャップ
ガラス：瓶

TL05

強壯生薬 配合

リキゴールA

内服液



鹿茸

第3類医薬品

効能・効果 滋養強壯、虚弱体質、
肉体疲労・病中病後・胃腸障害
・栄養障害・発熱性消耗性疾患
・産前産後などの場合の栄養補給

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (5)加温、冷凍はさけること。

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

〈お客様相談室〉06-6203-5151

受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50

使用
期限

製造
番号