

2011年10月（記載要領変更に伴う改訂）

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

薬用人参配合ビタミン含有保健薬

第3類医薬品



若甦錠Sは薬用人参をはじめ、各種ビタミン（ビタミンB群及びビタミンE）、パントテン酸カルシウム、オキソアミヂン（ニンニクの無臭有効成分）などを配合した滋養強壮保健薬で、虚弱体質、肉体疲労・病中病後などの場合の栄養補給に効果を現わします。

錠剤の識別ができるよう“JACKO”の印字を施すとともにビタミンB₂を使用した黄色の錠剤に仕上げました。



使用上の注意



相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

- 滋養強壮
- 虚弱体質
- 肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・妊娠授乳期・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給

用法・用量

次の量を水又はお湯と一緒に服用してください

年 齢	1回服用量	1日服用回数
成人（15才以上）	2錠	2回
15才未満	服用しないこと	

<用法・用量に関する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守してください
- (2)PTP包装の場合は、図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面アルミ箔を破り、取り出して服用してください
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながります)



成分・分量

成人1日量（4錠）中に次の成分を含んでいます

成 分	含 量	はたらき
ニンジン乾燥エキス	180mg (原生葉として600mg)	抵抗力、新陳代謝、疲労回復力を高め、また強壮作用があります
ビタミンE散	20mg (トコフェロール酢酸エステルとして10mg)	抗酸化作用、血行改善作用があり全身の血液の流れをよくし、全身に酸素や栄養素を運びます
ビスベンチアミン (ビタミンB ₁ 誘導体)	20mg	中枢神経や末梢神経の働きを正常に保つ作用があり、激しいスポーツなどで肉体疲労時に消耗するビタミンB ₁ を補います
リボフラビン (ビタミンB ₂)	10mg	脂肪などを燃やしてエネルギーに変える際に必要なビタミンです
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	20mg	タンパク質の成分であるアミノ酸の合成や分解に働くビタミンです
シアノコバラミン (ビタミンB ₁₂)	20μg	炭水化物、脂肪、タンパク質の代謝に関与し、造血などに欠くことのできないビタミンです
ニコチン酸アミド	20mg	糖質、脂肪をエネルギーに変える際に不可欠のビタミンです
パントテン酸カルシウムS	30.8mg (パントテン酸カルシウムとして20mg)	炭水化物を燃やしてエネルギーに変える際に必要なビタミンです
加工ダイサン末 (オキソアミヂン末)	20mg	ビタミンB ₁ 、B ₆ の吸収を促進するほか、疲労の蓄積を防ぎます 体力増強、疲労回復、新陳代謝促進作用があります

* 添加物として、ゼラチン、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、フマル酸、炭酸Ca、タルク、無水ケイ酸、乳酸Ca、リン酸水素Ca、ケイ酸Al、クロスカルメロースNa、ステアリン酸Mg、ステアリン酸、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、ヒプロメロース、アラビアゴム、酸化チタン、白糖、カルナウバロウを含有しています

<成分・分量に関する注意>

本剤に配合されているリボフラビン（ビタミンB₂）により、尿が黄色になることがあります

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください（瓶入りの場合は密栓して保管してください）
- (2)小児の手の届かない所に保管してください
- (3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください

本製品についてのお問い合わせ先

- ・お買い求めのお店
- ・日邦薬品工業株式会社 学術情報室
住 所：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-46-16
電 話：(03)3370-7174（代表）
受付時間：午前9:00から午後5:00まで（土、日、祝日を除く）

発 売 元  日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元  日東薬品工業株式会社

京都府向日市上植野町南開35-3