

本品には添付文書はありませんので、
ラベルの画像を掲載します。

4987305321664		新リコリス^{ゼンヤク}	販売名:新リコリス「ゼンヤク」
		20mL	
副作用被害救済制度 電話:0120-149-931		第2類医薬品	使用期限 (年,月) 製造番号
18-F		〔効能・効果〕 発熱性消耗性疾患・病中病後・肉体疲労・ 胃腸障害・妊娠授乳期・栄養障害などの場 合の栄養補給、虚弱体質、滋養強壮	使用上の注意 してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こり やすくなる。)長期連用しないこと。 相談すること 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談す ること。(1)医師の治療を受けている人。(2)高齢者。(3)次の症状のある人。 むくみ(4)次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病 2.服用後、まれに 下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は副作用の可能性があ るので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師の診療を受けること。 ●偽アルドステロン症、ミオパチー:手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわ ばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。3.5~6日間服 用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、 薬剤師又は登録販売者に相談すること。 (用法・用量)15才以上1回1びん(20mL)を1日3回服用してください。 *小児(15才未満)は服用しないこと。 (成分)(1びん20mL中)カンゾウ(甘草)エキス300mg(原生薬換算量 1,500mg)、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)5mg、オロチン酸コリン35mg、 パンテノール20mg、タウリン200mg 添加物としてアルコール、クエン酸Na、パラベン、プロピレングリコール、カラメル、 チンピチンキ、白糖を含有します。
		保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光のあたらない涼し い所に保管すること。(2)小児の 手のとどかない所に保管するこ と。(3)使用期限を過ぎた製品 は、服用しないこと。(4)キャッ プの切り口で手指等を切らない ように注意すること。	