

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# カタセ錠D3<sup>®</sup>

—カルシウム剤— (フィルムコーティング有核錠)

第2類医薬品

カタセ錠D3は、カルシウムの吸収を助けるビタミンD3とアミノ酸(L-リシン塩酸塩、タウリン)を配合した有核錠のカルシウム剤です。

12錠(15才以上の1日量)で600mgのカルシウムを含有しています。

## 【使用上の注意】



### 相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
医師の治療を受けている人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

便秘、下痢

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【効能・効果】

○次の場合のカルシウムの補給：  
妊娠・授乳期、発育期、老年期。

## 【用法・用量】

次の量を食後に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
15才以上	4錠	3回
7才以上 15才未満	2錠	
5才以上 7才未満	1錠	
5才未満	服用しないこと	

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)本剤は水又はぬるま湯で服用してください。

## 【成分】 (12錠中)


	成分	分量	解説
外皮	沈降炭酸カルシウム	1,165 mg	カルシウムとして466mg。 カルシウムは丈夫な骨や歯をつくるために必要なミネラルです。
	グルコン酸 カルシウム水和物	1,500 mg	カルシウムとして134mg。 カルシウムは丈夫な骨や歯をつくるために必要なミネラルです。
	タウリン	150 mg	生体成分の一つ。腸管からのカルシウム吸収促進作用があります。
内核	コレカルシフェロール (ビタミンD <sub>3</sub> )	400 IU	腸管からのカルシウムの吸収促進、骨組織へのカルシウム沈着促進作用があります。
	L-リシン塩酸塩	120 mg	必須アミノ酸の一つで、腸管からのカルシウム吸収促進作用があります。
	リボフラビン (ビタミンB <sub>2</sub> )	5 mg	黄色いビタミンです。

添加物としてゼラチン、タルク、ヒドロキシプロピルセルロース、D-マンニトール、ラウリン酸ソルビタン、カルメロース、グリセリン脂肪酸エステル、グリチルリチン酸、クロスカルメロースNa、硬化油、酸化チタン、ステアリン酸Mg、セルロース、中鎖脂肪酸トリグリセリド、白糖、ヒプロメロース、マクロゴールを含有します。

### 〈成分に関連する注意〉

本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、これは本剤中のリボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>)によるものですので、ご心配ありません。

## カタセ錠D<sub>3</sub>の断面



- 配合成分の安定性にすぐれた有核錠です。
- 内核の黄色は有効成分リボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>)によるものです。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)品質保持のため、錠剤をとりだすときはキャップにとり、手にふれた錠剤はビンに戻さないでください。
- (5)ビンの中の詰め物は、錠剤の破損防止のために入れてあります。開封後は詰め物をすててください。(開封後に詰め物を出し入れすると、湿気やホコリなどが入り込み、品質が低下する原因になる。)
- (6)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

## 問い合わせ先

- 1) お買い求めのお店
- 2) 全薬工業お客様相談室  
住 所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15  
電 話：03 (3946) 3610  
受付時間：9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)



製造販売元 **全薬工業株式会社**  
東京都文京区大塚5-6-15  
<http://www.zenyaku.co.jp>