

水溶性カルシウム剤

ツーリックCa錠[®]

Ca、VB₁誘導体、VB₆配合

カルシウムは、骨や歯の主成分として重要なばかりでなく、血液に溶けて全身をめぐる、細胞内の体液や血液を弱アルカリ性に保つなどの働きがあり、体にとって不可欠な物質の1つです。特に発育成長期のお子様には、骨や歯の形成のために、また、妊娠・授乳期の婦人には、胎児や母体の組織の増殖のために、平常より多くのカルシウムを必要とします。

ツーリックCa錠は、刺激が少なく吸収の良いグルコン酸カルシウムを主剤とし、これに発育期や妊娠・授乳期などに不足しがちなビタミンであるVB₁誘導体や塩酸ピリドキシンを配合したカルシウム剤です。

また、ツーリックCa錠は、VB₁誘導体を配合しているのでお子様にも吸収しやすいようになっています。

〔有効成分・分量〕（18錠中）

グルコン酸カルシウム……………2,200mg

チアミンジスルフィド(VB₁誘導体)……………15mg

塩酸ピリドキシン(VB₆)……………15mg

添加物として、キシリトール、乳糖、結晶セルロース、バレイショデンプン、HPC、タルクを含有します。

〔効能・効果〕

1. 次の場合の骨歯の発育促進：虚弱体質、腺病質
2. 妊娠授乳婦の骨歯の脆弱防止

〔用法・用量〕

15才以上……………1回6錠宛

11才以上～15才未満……………1回4錠宛

7才以上～11才未満……………1回3錠宛

5才以上～7才未満……………1回2錠宛

1日3回、食後に服用して下さい。

〔使用上のご注意〕

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
医師の治療を受けている人。
2. 服用に際して、次のことに注意して下さい。
 - (1)定められた用法・用量をお守り下さい。
 - (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
 - (3)本剤は、5才未満の乳幼児に服用させないで下さい。
3. 服用中又は服用後は、次のことに注意して下さい。
 - (1)本剤の服用により、便秘等の症状があらわれた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (2)しばらく服用しても症状の改善がみられない場合には、医師又は薬剤師に相談して下さい。
4. 保管及び取扱い上のご注意。
 - (1)小児の手のとどかない所に保管して下さい。
 - (2)直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
(ビタミンは直射日光にあてると分解し易い。)
 - (3)誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないで下さい。



製造販売元
富山薬品株式会社

富山市四方西岩瀬石瀬175