

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保存して下さい。

滋養強壯
保 健 薬

男性ホルモン・オットセイニンジンエキス散配合

オットローヤル

特徴

オットローヤルは、男性ホルモンであるメチルテストステロンにオットセイニンジンエキス散、ローヤルゼリー末等を配合した初老期以降に於ける男性のための薬です。

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他の男性ホルモン配合薬
2. 次の人は服用しないこと
 - (1) アンドロゲン依存性腫瘍（例えば前立腺癌）及びその疑いのある人。
（腫瘍の悪化を促すことがある）
 - (2) 肝機能障害で治療を受けている人。
 - (3) 前立腺肥大症で治療を受けている人。
 - (4) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (5) 女性。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 高齢者。
 - (3) ガンの骨転移のある人。
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (5) 薬によりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。
 - (6) 次の診断を受けた人。
肝臓病、心臓病、高血圧、腎臓病、糖尿病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
その他	陰茎肥大、持続性勃起、排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
肝機能障害	黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等 があらわれる。

(裏面につづく)

〔効能・効果〕

初老期以後の男子に於ける、精力減退・全身倦怠・疲労回復・老年性記憶力減退・更年期障害

〔用法・用量〕

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15才以上）	1カプセル	食前1～2回
15才未満	服用しないこと	

〔用法・用量に関連する注意〕

用法・用量を厳守すること。

〔成分・分量〕

1日量（2カプセル）中

成分	含量	はたらき
メチルテストステロン	2mg	精力減退や全身倦怠に効果があります。
オットセイニンジンエキス散 (海狗腎として1,000mg) (人參として6,000mg)	1,000mg	カイクジン ¹⁾ とニンジン ²⁾ をエキス化し、粉末にしたものです。 精力減退、全身倦怠感、疲労回復に効果をあらわします。 1)カイクジン(海狗腎):オットセイ <i>Callorhinus ursinus</i> L. (アシカ科)の陰莖・睾丸を乾燥したもの 2)ニンジン:オタネニンジン <i>Panax ginseng</i> C. A. Meyer (ウコギ科)の根を乾燥したもの
カフェイン	100mg	大脳皮質に作用し、中枢神経を興奮させる作用があります。
王乳(ローヤルゼリー)末	100mg	働き蜂の頭部の咽喉腺から分泌される淡黄色の濃いミルク様コロイド物質を粉末化したもので、タンパク質、脂肪、炭水化物、ミネラル、ビタミン等が含まれており、全身倦怠、疲労回復の効果があります。
硝酸チアミン(ビタミンB ₁)	40mg	疲労物質を除去して疲労を回復します。
パントテン酸カルシウム	20mg	新陳代謝を促して疲労を回復します。

添加物として乳糖、ラウリル硫酸Na、ゼラチン、赤色3号、黄色4号(タートラジン)、黄色5号、酸化チタンを含有します。

〔成分・分量に関連する注意〕

本剤の服用により、肝機能検査値に影響を及ぼすことがある。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (5) 品質を保持するため、服用の都度キャップをしっかりとしめること。
- (6) ぬれた手で触れたカプセルは、湿気等の影響で変質の恐れがあるので、元の容器に戻さないこと。



お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれる等、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室 電話：03(3370)7174(代表)
受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

発売元 日邦薬品工業株式会社 製造販売元 牛津製薬株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16 佐賀県小城市牛津町下砥川1-2