

本品には添付文書がありませんので、  
個箱の表記内容を掲載します。



開封年月日  
年 月 日  
開封時に記入してください

使用期限 (年月)  
製造番号  
酸性・虚弱体質に  
**カクセ錠**  
450錠  
第3類医薬品

開封口  
第3類医薬品  
酸性・虚弱体質に  
**カクセ錠**  
〔有核錠〕  
450錠

成分 (6錠中)  
カルシウム 720mg  
外皮:  
沈降炭酸カルシウム……………1,800mg  
(カルシウムとして720mg)  
ヨウニン末……………250mg  
内 核:  
モルシン……………100mg  
ヨウニン末……………50mg  
錠クロロフィルリンナトリウム……………10mg  
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)……………10mg  
添加物としてD-ソルビトール、タルク、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、グリセリン脂肪酸2K、クイ酸AO、硬脂酸、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒドロキシプロピルスターチ、無水ケイ酸、無水ケイ酸水合物を含有します。



保管及び取扱い上の注意  
(1)直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。  
(2)小児の手のとどかない所に保管してください。  
(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になり品質が変わる。)  
(4)品質保持のため、錠剤をとりだすときはキャップごと、手につれた錠剤はピンに戻さないでください。  
(5)ピンの中の詰め物(透明フィルム、クッション)は、錠剤の破損防止のために入れています。開封後、透明フィルムははずしてください。(開封後に詰め物を出し入れすると、湿気やホコリなどが入り込み、品質が低下する原因になります。)  
(6)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

第3類医薬品  
酸性・虚弱体質に  
**カクセ錠**  
〔有核錠〕  
450錠

効能・効果  
酸性体質\*、虚弱体質、栄養補給、妊娠婦および授乳婦の栄養補給  
\*酸性体質とは、体が虚弱で、病気にかかりやすい体質をいいます。  
用法・用量  
次の量を服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上	3錠	2回
7才以上 15才未満	2錠	
5才以上 7才未満	1錠	
5才未満	服用しないこと	

(用法・用量に関連する注意)  
(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。  
(2)本剤は水又はぬるま湯で服用してください。

使用上の注意  
相談すること  
1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。医師の治療を受けている人。  
2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この薬を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(併発)  
3.長期適用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

製造販売元  
**全薬工業株式会社**  
東京都文京区大塚5-6-15  
https://www.zenyaku.co.jp  
全薬工業お客様相談室 TEL 03(3946)3610  
(月～金曜日9:00～17:00(祝日を除く))

製造販売元 全薬工業株式会社

第3類医薬品 販売名:カクセ錠



副作用被害救済制度  
電話:0120-149-931

30100-001