

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。

婦 人 薬

喜谷実母散

喜谷実母散、ジツボンS 製造販売元

株式会社 キタニ

特 徴

喜谷実母散は永年にわたり、女性保健薬として多くの方々に愛用されております。精選された生薬をバランスよく配合することにより、更年期障害や冷え症等、女性特有の諸症状にすぐれた効果をあらわします。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合。

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発 疹 ・ 発 赤 、 かゆみ
消 化 器	悪 心 、 食 欲 不 振

- しばらく服用しても症状がよくなる場合。

成分及び分量 本品は1包中下記の成分を含有する。

(日局) トウキ……………2.25g	(日局) バクジュツ…0.75g
// センキュウ……………2.25g	// オウゴン……………0.75g
// センコツ……………1.12g	// チョウジ……………0.56g
// モッコウ……………1.12g	// オウレン……………0.38g
// ケイヒ……………0.94g	// カンゾウ……………0.19g
// ビンロウジ……………0.94g	1包…………… 11.25g

効能又は効果

更年期障害、※血の道症、月経不順、冷え症

およびそれらに随伴する次の諸症状：

月経痛、腰痛、頭痛、のぼせ、肩こり、めまい、動悸、
息切れ、手足のしびれ、こしけ、血色不良、便秘、むくみ

※【血の道症】

月経、妊娠、分娩、更年期や流産、妊娠中絶等、婦人特有の生理現象に関連して起こる症状で、頭痛、めまい、不眠、不安や興奮、錯乱等精神、神経的な症状が重なってあらわれることがあります。

(裏面をお読みください)

用法及び用量

大人1日1包を次のようにして4回服用します。

1回目及び2回目は、約1合(180ml)の熱湯を加えて振り出し、朝昼の食前に温服します。


3回目及び4回目は、水1合5勺(270ml)を加え半量に煎じつめたものを、夕食前及び就寝前に分けて温服します。

○1包を次のようにして服用してください。

1回目：熱湯180ml(大きめの茶碗1杯)に1包を浸し、適当な濃さに振り出して朝食前に服用します。

2回目：1回目に使用した実母散を同じように振り出して昼食前に服用します。

3回目 } 2回目に使用した実母
4回目 } 散に水270mlを加え、
半量まで煎じつめ、
夕食前及び就寝前に
分けて服用します。



保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

※1包はその日のうちに服用してください。

※振り出し後又は煎じた後、容器の底に沈殿物があっても、そのまま服用して差支えありません。

※生薬を原料として製造しているので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがありますが、効果には変わりありません。

包 装

5日分(5包入)・10日分(10包入)・30日分(30包入)

●実母散には多くの種類がございます。お買い求めの節には「喜き谷」でご指定ください。

喜谷実母散の他にも下記製品があります。

ジツボンS……………120錠、240錠、480錠

お客様相談窓口

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または、下記までお願いいたします。

株式会社 キタニ お客様相談室

電話 03-3716-2161

電話受付時間：月～金(祝・祭日を除く)午前9時～午後5時

喜谷実母散、ジツボンS 製造販売元

株式会社 キタニ

〒152-0002 東京都目黒区目黒本町2-5-3