

生薬製剤

婦参散 (フジンサン)

第2類医薬品

販売名：  
婦参散(フジンサン)

☆婦参散(フジンサン)は、血液循環をよくすることを主とし、気を落ち着かせる働きのある生薬類が配合されていますので、冷え症、貧血、生理不順や動悸、めまい、のぼせ、不眠などのいわゆる不定愁訴の改善に用いて効果があります。

☆携帯に便利なアルミ分包包装です。

 使用上の注意




してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)  
授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

- \* \* 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
  - (4) 胃腸の弱い人、胃腸が弱く下痢しやすい人
  - (5) 高齢者
  - (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (7) 次の症状のある人  
むくみ、食欲不振、吐き気・嘔吐、軟便、下痢
  - (8) 次の診断を受けた人  
心臓病、高血圧、腎臓病
  - (9) 次の医薬品を服用している人  
瀉下薬(下剤)
- \* \* 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、吐き気・嘔吐、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- \* \* 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
軟便、下痢
- \* \* 4. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- \* \* 5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能・効果

- 冷え症、貧血、こしげ<sup>注1)</sup>、のぼせ、頭重、ムクミ、耳鳴、息切れ、メマイ、動悸
  - 血の道<sup>注2)</sup>、更年期障害、生理不順、産前産後及びそれらに随伴する次の諸症  
不眠、神経衰弱、脱力感、悪心
- <sup>注1)</sup>「こしげ」とは、おりものことです。  
<sup>注2)</sup>「血の道」とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状及び身体症状のことです。

## 用法・用量

通常 1回 1～2包・1日 3回・食間に、水又はお湯で服用してください。

### 服用時間を守りましょう。

食間：食後 2～3時間後の空腹時を指します。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

### 服用方法



①最初に口の中に少しの水やぬるま湯をふくんでください。



②アルミをやぶって、薬を口の中に入れてください。



③水やぬるま湯を口にふくんで、薬と一緒にのみほします。



④もう一度、水やぬるま湯で口の中をゆすぐようにします。

## 成分・分量

1包1.5g・20包中に次の生薬より製したエキスを含有しています。

成分	分量	成分	分量
トウキ	8.0g	シヨウキヨウ	4.0g
シャクヤク	8.0g	コウボク	5.0g
センキュウ	8.0g	ソヨウ	4.0g
ブクリョウ	7.0g	ダイオウ	5.0g
ソウジュツ	7.0g	カンゾウ	5.0g
タクシャ	5.0g	コウブシ	5.0g
ポタンピ	6.0g	ニンジン	5.0g
トウニン	5.0g	ケイヒ	6.0g
ハンゲ	7.0g		

添加物としてカルメロースCa、無水ケイ酸を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



## その他

本剤は生薬を用いた製品ですから、製品により色調が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

お問い合わせ先

本製品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡お願い申し上げます。

「くすりの相談室」078-929-0112 9:00~17:30 (土、日、祝日、弊社休日を除く)