

鼻炎、皮膚のかゆみに

アレルギー用薬

タミナス[®]A錠

製品の特徴

タミナスA錠は、アレルギーによる鼻炎やじんましん、かゆみなどに効果のあるマレイン酸クロルフェニラミン、グルコン酸カルシウムおよびアスコルビン酸散を配合した内服のアレルギー用薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。
他のアレルギー用薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
(眠気があらわれることがあります。)
3. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 次の症状のある人
排尿困難
 - (5) 次の診断を受けた人
緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
その他	排尿困難

(2) 5～6日間服用しても症状がよくなりません

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。
口のかわき

効能・効果

鼻炎、じんましん、湿しん、かぶれ、かゆみ

用法・用量

1回下記量を食前に、水又はお湯と一緒に服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15才以上）	7錠	3回
11才以上15才未満	5錠	
8才以上11才未満	4錠	
8才未満	服用させないで下さい	

<用法・用量に関する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分とはたらき

成 分	分量 (21錠中)	は た ら き
グルコン酸カルシウム	1,400mg	じんましん、湿しんの症状をしずめます。
アスコルビン酸散 (アスコルビン酸として57mg)	58mg	皮ふや粘膜を正常に保つのに必要なビタミンで、 皮ふ炎、かゆみに効果があります。
マレイン酸クロルフェニラミン	8.75mg	抗ヒスタミン作用により、かゆみや炎症をおさえます。

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、バレイショデンプン、クエン酸、エチルセルロース、ヒドロキシプロピルスターチ、ショ糖脂肪酸エステルを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- (5) ビンの詰め物は、輸送中の内容物の破損を防ぐためのものです。
開封後は不要となりますので、取りのぞいて下さい。



ワンポイント情報

アレルギーとは

鼻炎やじんましん、湿しん、かぶれは、その人の体質や健康状態と密接なつながりがあり、アレルギー反応(体の過敏な反応)の結果としてあらわれるものです。

じんましんやかぶれは、小さな赤い斑点や局所的な赤い腫れとなり、強いかゆみを伴います。そのままにしておくと、その範囲が広がり、かゆみで眠れない、そして激しくかきむしることで症状をさらに悪化させます。

内服のアレルギー用薬で、からだの中からアレルギー反応をおさえることも大切です。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 東京支社 お客様相談室

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目5-1

(03)3293-3363 (ダイヤルイン)

(月～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 但し祝日を除く)



製造販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624

本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36

<http://www.wakunaga.co.jp/>