

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

鼻炎、皮膚のかゆみに
アレルギー用薬

第2類医薬品

タミナス[®]A錠

製品の特徴

タミナスA錠は、アレルギーによる鼻炎やじんましん、かゆみなどに効果のあるクロルフェニラミンマレイン酸塩、グルコン酸カルシウム水和物およびアスコルビン酸散を配合した内服のアレルギー用薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
他のアレルギー用薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬等)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気等があらわれることがあります。)
3. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4) 次の症状のある人 排尿困難
(5) 次の診断を受けた人 緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわき、眠気
4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

鼻炎、じんましん、湿しん、かぶれ、かゆみ

用法・用量

1 回下記量を食前に、水又はお湯と一緒に服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人(15才以上)	7 錠	3 回
11才以上15才未満	5 錠	
8才以上11才未満	4 錠	
8才未満	服用させないでください	

<用法・用量に関する注意>

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分とはたらき

成 分	分 量 (21錠中)	は た ら き
グルコン酸カルシウム水和物	1,400mg	じんましん、湿しんの症状をしずめます。
アスコルビン酸散 (アスコルビン酸として57mg)	58mg	皮膚や粘膜を正常に保つのに必要なビタミンで、皮膚炎、かゆみに効果があります。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	8.75mg	抗ヒスタミン作用により、かゆみや炎症をおさえます。

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖、パレイショデンプン、クエン酸、エチルセルロース、ヒドロキシプロピルスターチ、ショ糖脂肪酸エステルを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) ビンの詰め物は、輸送中の内容物の破損を防ぐためのものです。
開封後は不要となりますので、取りのぞいてください。

●ワンポイント情報 アレルギーとは

鼻炎やじんましん、湿しん、かぶれは、その人の体質や健康状態と密接なつながりがあり、アレルギー反応(体の過敏な反応)の結果としてあらわれるものです。

じんましんやかぶれは、小さな赤い斑点や局所的な赤い腫れとなり、強いかゆみを伴います。そのままにしておくと、その範囲が広がり、かゆみで眠れない、そして激しくかきむしることで症状をさらに悪化させます。

内服のアレルギー用薬で、からだの中からアレルギー反応をおさえることも大切です。



お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目5-1

☎03-3293-3363

受付時間 9時～12時、13時～17時(土、日、祝日を除く)



製造販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624

本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36

http://www.wakunaga.co.jp/