

服用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

アレルギー用薬

# パース®S錠

第2類医薬品

## ⚠️《使用上の注意》

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。  
他のアレルギー用薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。  
(眠気があらわれることがあります。)
3. 長期連用しないで下さい。



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 高齢者。
  - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5) 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
  - (6) 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、腎臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

| 関係部位  | 症 状        |
|-------|------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ  |
| 消 化 器 | 悪心・嘔吐、食欲不振 |
| そ の 他 | 排尿困難       |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合には直ちに医師の診療を受けて下さい。

| 症状の名称     | 症 状                                                |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 偽アルドステロン症 | 尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる |

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。  
口のかわき

## 効能又は効果

じんましん、湿疹・かぶれによるかゆみ、鼻炎

## 用法及び用量

下記の量を1日3回食後に服用して下さい。

| 年 齢       | 1 回 量     |
|-----------|-----------|
| 成人（15歳以上） | 2錠        |
| 8歳以上15歳未満 | 1錠        |
| 8歳未満の小児   | 服用しないで下さい |

（用法・用量に関連する注意）

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

## 成分及び分量

成人1日量（6錠）中に次の成分を含んでいます。

| 成 分            | 分 量   |
|----------------|-------|
| マレイン酸クロルフェニラミン | 12mg  |
| 酪酸リボフラビン       | 12mg  |
| 塩酸ピリドキシン       | 15mg  |
| グリチルリチン酸ニカリウム  | 110mg |

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、ステアリン酸Mgを含有します。

## 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

## お問い合わせ先

発 売 元：ゼネル薬品工業株式会社

電話番号：06-6352-2381

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）



発 売 元 **ゼネル** 薬品工業株式会社 大阪市北区天満3丁目6番1号  
製造販売元 **ゼネル** 薬工粉河株式会社 和歌山県紀の川市粉河840番地