

第2類医薬品

アレルギー用薬

パートス[®]S錠

ZENEL

56錠

アレルギー用薬

パートス[®]S錠

第2類医薬品

じんましん

湿

疹

かぶれ
による

かゆみ

鼻

炎

成分及び分量 成人1日量（6錠中）

クロルフェニラミンマレイン酸塩12mg、リボフラビン酸エステル12mg、
ピリドキシン塩酸塩15mg、グリチルリチン酸二カリウム110mg

添加物：乳糖、トウモロコシデンプン、セルロース、ヒドロキシプロピルセル
ロース、CMC-Ca、ステアリン酸Mg

お問い合わせ先

電話番号：06-6352-2381 受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

使用
期限

製造
番号

ゼネラル 薬工粉河株式会社
和歌山県和歌山市粉河 840番地

製造販売元

ゼネラル 薬品工業株式会社
大阪府北摂天満3丁目6番1号

発売元



4 962721 103155



効能又は効果
じんましん、湿疹・かぶれによるかゆみ、鼻炎

用法及び用量

成人（15歳以上） 1回2錠・8歳以上15歳未満 1回1錠を1日3回食後に服用する。
*（1）用法・用量を厳守して下さい。（2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。（3）8歳未満の小児は服用しないで下さい。

第2類医薬品

パートス®S錠

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が
起こりやすくなります）

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。
他のアレルギー用薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬、
鼻炎用内服薬、乗物酔い薬）
2. 服用後は乗物等の運転をしないで下さい（眠気があらわれることがあります）。
3. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - （1）医師の治療を受けている人。
 - （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - （3）高齢者。
 - （4）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - （5）次の症状のある人。むくみ、排尿困難
 - （6）次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - （1）服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合には直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、 手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる

- （2）5～6日間服用しても症状がよくなる場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。
口のかわき

保管及び取り扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。（2）小児の手の届かない所に保管して下さい。（3）他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わります）。（4）1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。（5）使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。