

第2類医薬品

アレルギー用薬

パートス[®]S錠

ZENEL

56錠

アレルギー用薬

パートス[®]S錠

第2類医薬品

じんましん

湿 疹

かぶれ
による かゆみ

鼻 炎



成分及び分量 成人1日量（6錠中）

クロルフェニラミンマレイン酸塩 12 mg、リボフラビン酪酸エステル 12 mg、
ピリドキシリン塩酸塩 15 mg、グリチルリチン酸二カリウム 110 mg
添加物：乳糖、トウモロコシデンプン、セルロース、ヒドロキシプロピルセ
ルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg

製造
番号

お問い合わせ先

電話番号：06-6352-2381 受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

使用
期限



発売元 **ゼノール** 薬品工業株式会社
大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元 **ゼノール** 薬工粉河株式会社
和歌山県紀の川市粉河 840 番地

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。
他のアレルギー用薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬等)
2. 服用後は乗物等の運転をしないで下さい(眠気等があらわれることがあります)。
3. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難 (6) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合には直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
口のかわき、眠気
4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

保管及び取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因となったり品質が変わります)。(4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

効能又は効果

じんましん、湿疹・かぶれによるかゆみ、鼻炎

用法及び用量

成人（15歳以上） 1回2錠・8歳以上15歳未満 1回1錠を1日3回食後に服用する。

* (1) 用法・用量を厳守して下さい。(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。(3) 8歳未満の小児は服用しないで下さい。