

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ピロットA錠

持続性アレルギー用薬

ピロットA錠は、かゆみを抑える抗ヒスタミン剤（メキタジン）に、3種のビタミン（ビタミンB₂、ビタミンB₆、ニコチン酸アミド）を配合したアレルギー用薬で、しっしんによるかゆみ、鼻炎などに効果を発揮します。

【使用上の注意】



してはいけないこと



（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。）

1. 次の人は服用しないでください。
本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他のアレルギー用薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
（眠気があらわれることがある。）
4. 服用時は飲酒しないでください。
5. 長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
（1）医師の治療を受けている人。
（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
（3）授乳中の人。
（4）高齢者。
（5）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
（6）次の症状のある人。
排尿困難
（7）次の診断を受けた人。
緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
（1）服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、腹痛
精神神経系	頭痛、ふらふら感
その他	排尿困難

〔表面からのつづき〕

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）等があらわれる。
血小板減少	血液中の成分である血小板の数が減ることにより、鼻血、歯ぐきからの出血、青あざ等の出血症状があらわれる。

（2）5～6日間服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

口のかわき

【効能・効果】 湿疹・かぶれによるかゆみ、じんましん、鼻炎。

【用法・用量】 次の1回量を1日2回（朝・夕）服用してください。

年 齢	1 回 量
15才以上	2 錠
15才未満	服用しないこと

用法・用量に関連する注意

本剤は水又はぬるま湯で服用してください。

【成 分】（4錠中）

メキタジン.....4 mg 塩酸ピリドキシン（ビタミンB₆）...30 mg
リボフラビン（ビタミンB₂）...12 mg ニコチン酸アミド.....60 mg
添加物として乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースNa、硬化油、酸化チタン、ステアリン酸M₈、セルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、マクロゴールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- （1）直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- （2）小児の手のとどかない所に保管してください。
- （3）他の容器に入れかえないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- （4）使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

問い合わせ先

- 1）購入した薬局・薬店
- 2）お客様相談室

住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-22-14

電話：03（3986）0613

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝祭日を除く）



製造販売元

全薬工業株式会社

東京都豊島区東池袋3-22-14

営業所 東京都文京区大塚5-6-15

<http://www.zenyaku.co.jp>