

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管しておいてください。

持続性抗ヒスタミン剤

メキタジン錠「アマノ」

アレルギー性鼻炎（花粉症など）、じんましん等では、抗原抗体反応の結果として人に有害な作用（かゆみ、鼻づまり、かぶれ）が現れます。この反応をアレルギー反応といいます。この反応は、ヒスタミン等により起こり、抗ヒスタミン剤で抑えることができます。

メキタジンはフランスで開発された新しい抗ヒスタミン薬で、眠気が少なく、効果が長く持続します。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

1. 次の人は服用しないでください
本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他のアレルギー用薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
（眠気があらわれることがある。）
4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 次の症状のある人。
排尿困難
(5) 次の診断を受けた人。
緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。

肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)等 があらわれる。
血小板減少	血液中の成分である血小板の数が減ることにより、 鼻血、歯ぐきからの出血、青あざ等の出血症状が あらわれる。

(2) 5～6日間服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が
見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
口のかわき

〔効能・効果〕

じんましん、湿疹・かぶれによるかゆみ、鼻炎

〔用法・用量〕

15才以上1回1錠1日2回朝夕服用する。

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください
- (2) 小児には服用させないでください
- (3) お酒などアルコール類と併用しないでください

〔成分・分量〕

1日量(2錠中)

メキタジン..... 4 mg

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、セルロース、タルク、ステアリン
酸カルシウムを含有する。

〔保管及び取り扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 使用期限(外箱に書いてあります)の過ぎたものは、使用しないでください。
- (5) 錠剤の取り出し方：右図のように錠剤の入っている
PTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアル
ミ箔を破り取り出してください。(誤ってそのま
ま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思
わぬ事故につながります。)



〔お客様相談窓口〕

本剤についてのお問い合わせはお買いもとめの薬局・薬店、又は下記までご
連絡くださいますようお願い申し上げます。

東洋ファルマー株式会社 安全管理部

〒932-0211 富山県南砺市井波885番地

電話番号 0763-82-3151

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

発売元



製造
販売元



天野商事株式会社

名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

東洋ファルマー株式会社

富山県南砺市井波885番地