

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

深 量

(生薬製剤)



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)
授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳は避けてください。



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (5) 発汗傾向の著しい人
 - (6) 高齢者
 - (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (8) 次の症状がある人 排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
 - (10) 次の医薬品を服用している人 瀉下薬 (下剤)
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

- (2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくならない場合
- 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。 軟便、下痢

効能・効果
蕁麻疹

用法・用量

食間に水又はお湯にて服用します。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人	1 包	3 回
7 ～ 15 歳	1 / 2 包	
4 ～ 6 歳	1 / 3 包	
4 歳 未 満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 食間とは、食事と食事の間という意味で、食後2時間後位をいいます。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

本品1包(2.0g)中、下記生薬を含有します。

ケ イ ヒ 末	----- 0.2g	オ ウ ヒ 末	----- 0.2g
シャクヤク末	----- 0.2g	ショウキョウ末	----- 0.2g
チ ン ピ 末	----- 0.2g	カ ッ コ ン 末	----- 0.2g
カ ン ゾ ウ 末	----- 0.2g	ト シ シ 末	----- 0.2g
マ オ ウ 末	----- 0.2g	ダ イ オ ウ 末	----- 0.2g

添加物は含有していません。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、天然の生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで(土、日、祭日を除く)

製造販売元

株式会社 **建林松鶴堂**

〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7