

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

お肌の殺菌消毒に

第3類医薬品

アポスティーゴローション

aposty lotion

殺菌消毒ローション剤

通常、皮ふの表面には、多種類の細菌がバランスよく存在して、皮ふ細菌叢をつくっています。

しかし、環境の変化などにより皮ふの細菌間のバランスがくずれてしまうと、特定の細菌が増殖してしまい、とびひ、おできや日常よく見られるにきび等のお肌のトラブルが起こります。

また、皮膚炎によるかゆみやお肌の乾燥症状などが原因で皮ふをかきこわしてしまい、かき傷ができると症状はさらに悪化してしまいます。

アポスティーゴローションは、健康な皮ふを取り戻すためにお使いいただく使用感の良い殺菌消毒ローション剤です。

本品の適量を手のひらにとるか脱脂綿にふくませ、顔や手足などの患部にお使いください。

〔特 徴〕

○マイクロエマルジョン製剤なので、べとつかず使用感に優れています。

○保湿効果のある基剤を使っているので、使用後はしっとりします。

○皮ふと同じ弱酸性で、無着色、無香料の外用剤です。



かき傷



感染皮ふ面の消毒



創傷面の殺菌・消毒



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体质の人。
- (3) 薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。
- (5) 深い傷やひどいやけどの人。

(必ず裏面もお読みください)

D08N

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ

(2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

[効能・効果]

かき傷、創傷面の殺菌・消毒、とびひ・おでき等の感染皮ふ面の消毒、きり傷、すり傷、さし傷、靴ずれ

[用法・用量]

1日数回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 定められた用法・用量を守ってください。

[成 分] 100mL中

成 分	分量	はたらき
ベンゼトニウム塩化物	0.01g	殺菌消毒作用があります。
グリチルリチン酸二カリウム	0.12g	皮ふの炎症を抑えます。
アラントイン	0.12g	傷ついた組織を治します。
トコフェロール酢酸エステル	0.1g	患部の血行を良くし、新陳代謝を高めます。

添加物として、エタノール、グリセリン、1,3-ブチレングリコール、セスキオレイン酸ソルビタン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、クエン酸、クエン酸Na及びパラベンを含有する。

[保管及び取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して立てて保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室
TEL 03-3661-2080 (ダイヤルイン)
受付時間 9:00~17:50 (土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
フリーダイヤル ☎ 0120-149-931

発売元



ゼリア新薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町10-11

製造販売元

株式会社 資生堂
東京都中央区銀座7-5-5



D08N

アボスティーはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。

アボスティー ローション