

この説明文書は使用前に必ずお読みください。また必要なとき読めるように保存しておいてください。

第3類医薬品

## キズ・やけどの殺菌・消毒に 外用殺菌消毒薬

# インジン® 軟膏

インジン軟膏の有効成分「ポビドンヨード」は、世界各国で使用されている殺菌消毒薬です。いろいろな細菌やウイルスに対して幅広く、短時間ですぐれた殺菌・消毒効果を発揮します。きり傷・すりむき傷・やけどなどの患部の殺菌・消毒にすぐれた効果を発揮します。

### 特徴

- 各種の細菌、真菌、ウイルスなど広範囲の微生物に対し、迅速な殺菌・消毒効果を発揮します。
- 刺激性が弱く、皮膚の消毒に適しています。
- インジンの色は、消毒範囲を示し、塗り残しを防げます。  
また、衣服についたものは、水で容易に洗い落とせます。

## ⚠ 使用上の注意

### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)

次の人は使用しないでください

本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人

### 相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
- (3) 患部が広範囲の人
- (4) 深い傷やひどいやけどの人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

## 効能・効果

きり傷、さし傷、すりむき傷、靴ずれ、やけどなどの患部の殺菌・消毒

## 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 本剤は外用のみに使用し、内服、うがいや粘膜の殺菌・消毒には使用しないでください。

## 成分・分量

1g中 ポビドンヨード100mg(有効ヨウ素として10mg)  
添加物として マクロゴール、pH調整剤を含有しています。

## 保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変化します。)
- (4)衣服などに付着すると着色しますのでご注意ください。  
なお、付着した場合にはすぐに水でよく洗い落としてください。
- (5)使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。

### 〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、  
または下記までお願いいたします。

シオノギヘルスケア株式会社【医薬情報センター】

電話：[大阪] 06-6209-6948 受付時間：9時～17時(土、日、祝日を除く)  
[東京] 03-3406-8450

「副作用被害救済制度」について

(独)医薬品医療機器総合機構

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

®:登録商標