

TRADE MARK

殺菌消毒薬

第3類医薬品

日本薬局方

オキシドール

「東海」(AP)

Oxydol

100mL

東海製薬株式会社

名古屋市中川区江松一丁目105

お客様相談室 ☎052-302-8501

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

長期連用しないこと

☒ 相感すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(3) 患部が広範囲の人

(4) 深い傷やひどいやけどの人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効 能・効 果】

傷の消毒・洗浄

【用 法・用 量】

そのままの液または2～3倍に水でうすめた液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部を洗う。

<用法・用量に関連する注意>

(1) 用法・用量を厳守すること。

(2) 顔面など皮膚の敏感な個所に適用する場合には、はじめは低濃度から開始すること。

(3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

(4) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医師の診療を受けること。

(5) 外用にのみ使用すること。

【成 分・分 量】

過酸化水素(H₂O₂) 2.5～3.5w/v%を含有する。

添加物としてアセトアニリドを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない冷所(30℃以下)に密栓して保管すること。

(2) 小児の手の届かない所に保管すること。

(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

(5) 保存中に瓶内の圧力が高くなっていることがあるので、瓶口を顔にむけぬようにして、キャップをあげることを。

 キャップ:PP

 ボトル:PE

外装フィルム:PVC

副作用被害救済制度

☎:0120-149-931

製造番号

使用期限



4 987394 105916