



外傷救急薬

ナクロカインSR

第2類医薬品

色がつかない
キズ口の殺菌・消毒

ナクロカインSR

第2類医薬品



60mL

昭和製薬株式会社
大阪府守口市南寺方東通1-4-12

効能・効果

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

用法・用量

1日数回適量を患部に塗布する。

＜用法・用量に関連する注意＞

- ①用法を守ること。
- ②小児に使用させる場合には保護者の指導監督のもとに使用させること。
- ③目に入らないように注意すること。
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- ④顔や粘膜には使用しないこと。
- ⑤外用にのみ使用すること。

成分・分量（本品1mL中）

ジブカイン塩酸塩	1mg
ナファゾリン塩酸塩	1mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	2mg
ベンゼトニウム塩化物	1mg

添加物として香料を含有する。

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

製造番号

使用期限

保管及び取扱い上の注意

- ①直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- ②小児の手の届かない所に保管すること。
- ③使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

●ご使用法

容器をさかさまにし、容器を軽く押して下さい。薬液が流れ出ます。
ガーゼ、脱脂綿に含ませるなど適切にご使用下さい。



使用前に次の説明を必ずお読み下さい

⚠ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。

- ①医師の治療を受けている人。
- ②本人又は家族がアレルギー体質の人。
- ③薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ④患部が広範囲の人。
- ⑤深い傷やひどいやけどの人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、本品をもって医師又は薬剤師に相談すること。

①使用後、次の症状があらわれた場合

- 皮膚：発疹・発赤、かゆみ、はれ
- ②5～6日間使用しても症状の改善がみられない場合。