

muhi
アレルギーマスク

外用専用
75mL

ムヒ®のきず液

2つの工夫の 消毒薬

①
殺菌
+
組織修復



②
誤飲対策
処方



しみない殺菌・消毒薬

〔効能〕すり傷、さし傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒〔有効成分75mL中〕ベンゼトニウム塩化物75mg アラントイン150mg 添加物としてエデト酸Na、亜硫酸Na、クエン酸、クエン酸Na、ニコチン酸アミドを含有します。

〔用法・用量〕1日数回患部に噴霧またはガーゼ、脱脂綿に浸して塗布してください。 ©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV

製造 株式会社 池田模範堂
販売元 富山県中新川郡上市町神田16番地

お客様相談窓口 ☎076-472-0911
(平日9:00~17:00)

第3類
医薬品

使用上の注意

相談すること 1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること(1)医師の治療を受けている人。(2)本人又は家族がアレルギー体質の人。(3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)患部が広範囲の人。(5)深い傷やひどいやけどの人。2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師又は薬剤師に相談すること(1)使用后、次の症状が皮ふにあらわれた場合。発疹・発赤、かゆみ(2)5~6日間使用しても症状がよくならない場合。

〔用法・用量に関連する注意〕(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。使用開始目安年齢:生後3カ月以上(2)目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(3)外用にのみ使用し、内服しないこと。

〔保管及び取扱い上の注意〕(1)小児の手のとどかない所に保管すること。(2)高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限(底面に西暦年と月を記載)をすぎた製品は使用しないこと。



外装フィルム
ボトル
キャップ

副作用救済制度
☎0120-149-931

®登録商標 AA08