

この説明書は、本剤とともに保管し、ご使用の際には、必ずお読みください。

①

きず薬

きりきず、すりきず、
軽度のやけどに



MEMO®-A

MEMO-Aは、殺菌剤、傷の痛みをしずめる局所麻酔剤、傷の治りをはやめる成分などを配合したなめらかで伸びのよい軟膏で、きり傷、すり傷、やけどなどにすぐれた効果をあらわします。

ご家庭の常備薬として、またスポーツ時や旅行の際の携帯薬としてご使用ください。

△ 使用上の注意

■ 相談すること


1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 患部が広範囲の人。
 - (5) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

■ 効能・効果

- きり傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ
- 軽度のやけど
- 創傷面の殺菌・消毒



■ 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布します。

®：登録商標

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

■ 成 分 1g中

グルコン酸クロルヘキシジン液……………10mg
 塩酸ジブカイン……………3mg
 アラントイン……………10mg
 ビタミンE酢酸エステル……………1mg
 酸化亜鉛……………50mg

添加物として、パラフィン、ワセリン、サラシミツロウ、トリオレイン酸ソルビタン、フェノール、チモール、香料を含有します。

■ きり傷、すり傷、軽いやけどの治療は…

- きり傷、すり傷などのちょっとした傷や、軽いやけどであつても早めのお手当てが大切です。
- 次のようなことに気をつけてお手当てしてください。
- 傷口に砂や小石などが付着している場合は水道水などできれいに洗い流し、かわかした後、MEMO-Aを塗布しましょう。
 - やけどをしたら、患部をすぐに冷たい水につけて冷やし、その後MEMO-Aを塗布しましょう。
 - 傷口がふさがるまでは、絆創膏、ガーゼなどで患部を保護するようにしましょう。
 - 傷口にできたかさぶたは、無理にはがさないようにしましょう。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にフタをよくしめて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になつたり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限をすぎたものは使用しないでください。

■ お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室
フリーダイヤル ☎ 0120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒107-8589 東京都港区赤坂4-2-6

http://www.ssp.co.jp/

1005C

11-5A0