



押しあける

実寸大
ガーゼ
50×40mm
固定用粘着シート
82×70mm

使用前にこの説明文書を必ず読むこと

△使用上の注意

❌してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の人は使用しないこと(1)患部が広範囲の人(2)深い傷やひどいやけどの人

⚠️相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けている人(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
皮膚・発疹・発赤、かゆみ3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒・被覆
【用法・用量】アルミ袋を開封し、中のガーゼをピンセットで取り出し、つやのある面(フィルム面)を傷口にあて、添付の固定用粘着シートで被覆固定してください。薬剤が特殊加工フィルムを透過して傷を消毒し、ガーゼと傷の固着も防ぎます。又、創傷面を消毒する際にはガーゼ面(つやのない面)で清拭してください。創傷面が特に小さい場合には適宜折りたたむか、又は裁断の上使用してください。

用法及び用量に関連する注意(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合にはすぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(3)外用にのみ使用すること。(4)固定用粘着シートの貼付部位に発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には、固定用粘着シートの使用を中止し、包帯等の方法で固定すること。(5)固定用粘着シートの粘着面を直接患部に貼らないこと。(6)ガーゼについている透明なフィルムは、はがさずにそのまま使用すること。(7)固定用粘着シートに薬液がしみ出すことがあるので、そのような場合は上から包帯を巻くなど、衣服を汚さないように注意すること。(8)患部を清潔にし、ガーゼ部分を汚さないように注意して使用すること。

【成分・分量】
本品1包(1.8g)中
アグリノール水和物0.2%液…1.5g
基布(4×5cm)…0.3g
添加物 濃グリセリン

【内容品】
薬液含浸ガーゼ 12枚
固定用粘着シート 12枚
ピンセット 1個

【保管及び取扱い上の注意】
(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
(2)小児の手の届かない所に保管すること。
(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
(4)使用期限をすぎた製品は使用しないこと。(使用期限は箱底面に記載)

紙 外箱
結束テープ
固定用粘着シート袋

指定医薬部外品

化膿を防ぐ ウエットタイプの 殺菌消毒パッド

12包

指定医薬部外品

化膿を防ぐ 貼れる 殺菌消毒液

特殊フィルム使用で 傷口にくっつかない

12包

ガーゼ 50mm×40mm
固定用粘着シート 82mm×70mm

手が汚れない
ピンセット付

1 つやのある面を傷口にあて
2 上に粘着シートを貼るだけ

ピタッ!

使用期限
製造番号

4 901957 020089

【ご注意】

通気性の良い固定用粘着シートを使用しているため、薬液がしみだしてくるおそれがありますので、じかに衣類等が触れないようご注意ください。
万一、薬液が付着した場合は、すぐに付着した生地の下にガーゼ又はタオル等をあて、酢を浸した脱脂綿等で付着部分を上から繰り返したいてください。
その後、酸素系漂白剤の使用できる衣類等については、液体の酸素系漂白剤を付着した部分に塗布して漂白してください。

玉川衛材(株)お客様相談窓口
TEL.03-4334-8857
受付時間 10:00～17:00
(土・日・祝日を除く)
<https://www.tamagawa-eizai.co.jp>
製造販売元
玉川衛材株式会社
東京都千代田区富士見1-8-19
LL8-SP