

外用殺菌消毒薬

日本薬局方

希ヨードチンキ

Dilute Iodine
Tincture

100mL

医薬品

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

日本薬局方 希ヨードチンキ

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 1 次の部位には使用しないこと
粘膜（口唇等）、口の中、目の周囲、化粧している面部
- 2 本剤を使用している時は、次の医薬品を使用しないこと
マーキュロクロム酒
- 3 広範囲又は長期連用しないこと

相談すること 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 第によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 痘部が広範囲の人。
 - (5) 深い瘡やひどいやけどの人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談すること
- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 小	発赤・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感、水ぶくれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
アナフィラキシー 過敏性	胸苦しさ、むくみ、じんましん、発疹等があらわれる。

(2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合



製造免責元

健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

外用殺菌消毒薬

日本薬局方

希ヨードチンキ

Dilute Iodine
Tincture

100mL

医薬品

【効能効果】創傷面の殺菌・消毒

【用法用量】適量を1日数回患部に塗布する。

【用法用量に関する注意】

- (1)用法用量を厳守すること。
 - (2)患部及び皮膚に軽く擦るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼付しないこと。
 - (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用されること。
 - (4)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
 - (5)外用にのみ使用すること。
- 【成分量】 100 mL 中
ヨウ素 3 g 含有
添加物：ヨウ化カリウム、エタノール
- 【保管及び取扱い上の注意】
- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
 - (2)小児の手の届かない所に保管すること。
 - (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になつたり品質が変わること。)
 - (4)火気に近づけないこと。
 - (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。



製造免許元

健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626



製造番号
使用期限