

Nikko

〔一般用医薬品〕 第3類医薬品

日本薬局方 外皮用殺菌消毒剤

希ヨードチンキ

Dilute Iodine Tincture

50mL 希ヨードチンキ
「コザカイ・P」



キャップ:PP
外装フィルム:PE

ガラス:瓶

発売元 日興製薬販売株式会社
東京都千代田区神田区船町52番地

製造販売元 小堺製薬株式会社
東京都墨田区奥田4-34-9



2012年4月改訂
(記載要領変更に伴う改訂等)

ご使用に際して、この説明文書を
必ずお読みください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり
副作用が起こりやすくなります。〕

1. 次の人は使用しないでください。
本剤又は本剤の成分によりアレルギー
症状を起こしたことがある人
2. 局所刺激作用があるため、軽く塗る
だけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して
患部に貼付しないでください。
3. 次の部位には使用しないでくださ
い。目の周り、口唇等の粘膜の部分
4. 皮膚炎を起こすことがあるので、広範
用又は長期間使用しないでください。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたこ
とがある人
(3) 患部が広範囲の人
(4) 深い傷やひりひりやけどの人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副
作用の可能性があるので、直ちに使用
を中止し、この製品を持って医師、薬剤
師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、 灼熱感、水泡等

まれに下記の重篤な症状が生じることがあります。
その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
アナフィラキ シー様症状	使用後すぐに、皮膚のかゆ み、じんましん、声のかすれ、 くしゃみ、のどのかゆみ、 息苦しさ等があらわれる

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場
合は使用を中止し、この製品を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談してください。

その他の注意

化粧品にはかえって症状を悪化させることが
あるので、使用には注意してください。

効能・効果

創傷面の殺菌・消毒

用法・用量

適量を1日数回患部に塗布する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 創傷等に浸してご使用ください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指
導監督のもと使用させてください。

(3) 目に入らないように注意してください。
万一、目に入った場合には、すぐに水
又はぬるま湯で洗い流してください。
なお、症状が重い場合には、直ちに眼科
医の診察を受けてください。

- (4) 添付文書のみ使用し、内服しないでください。
- (5) 定められた用法を厳守してください。
- (6) マーキュロクロム液と同時に使用しない
でください。

成 分

本品50mL中にヨウ素1.5gを含有します。添加
物としてヨウ化カリウム、エタノールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 火気及び直射日光を避け、なるべく涼し
い所に密封して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。
(瓶用の原因になったり品質が変わるお
それがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないで
ください。

日興製薬販売お客様相談窓口

電話番号 03-3254-1831

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝日は除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

使用期限:

製造番号: