

外用殺菌消毒剤

TRADE MARK

SEI

第3類医薬品

日本薬局方

希ヨードチンキ

「タイセイ」P

Dilute Iodine Tincture

500mL

製造販売元
大成薬品工業株式会社
福岡県筑後市大字熊野字屋敷998-1

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

使用上の注意

☒ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと。
口唇等の粘膜の部分、口の中、目のまわり、化膿している患部
2. マーキュロクロム液と同時に使用しないこと。
3. 広範囲又は長期間使用しないこと。

☒ **相談すること**

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること。
 - 1) 医師の治療を受けている人。
 - 2) 本剤またはヨウ素に対して過敏症の既往歴がある人。
 - 3) 本人または家族がアレルギー体質の人。
 - 4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 5) 患部が広範囲の人。
 - 6) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談すること。
 - 1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに、下記の重篤な症状が起こることがあるので、その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様症状	胸苦しさ、むくみ、じんましん、発疹、不快感、悪心、口内のあれ、しみる、灼熱感、また口内の刺激等があらわれる。

- 2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】

創傷面の殺菌・消毒

【用法・用量】

適量を1日数回患部に塗布する。

<用法用量に関連する注意>

- (1) 用法用量を厳守すること。
- (2) 患部および皮膚に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿に浸して塗布しないこと。
- (3) 小児に使用する場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用すること。
- (4) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けること。
- (5) 外用にのみ使用すること。

【成分・分量】

本品100mL中 ヨウ素3gを含有する。
添加物としてヨウ化カリウム、エタノールを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに、密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (3) 他の容器に入れかえないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 火気に近づけないこと。

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、あるいは下記にお願いいたします。
大成薬品工業株式会社 お客様相談室
電話：0942-53-4662 (代表) 9:00～17:00 (土日・祝日は除く)

使用期限

製造番号

キャップ:PP
本体:ガラス

