

NIKKO

第3類医薬品

日本薬局方 消毒用エタノール

外皮用殺菌消毒剤

500mL

飲用不可

貯 法：遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存
使用期限：3年（表示の使用期限を参照すること。）
注 意：取扱い上の注意の項参照

製造販売元
 日興製薬株式会社
岐阜県羽島市江吉良町1593

使用に際して、この説明を必ず読むこと。

【使用上の注意】

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。）
次の部位には使用しないこと。
口唇等の粘膜の部分や目のまわり

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 患部が広範囲の人。
 - (4) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効能・効果】

創傷面の殺菌・消毒

【用法・用量】

本液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部に軽く塗る。

＜用法・用量に関する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないこと。
- (3) 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。
- (4) 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
- (5) 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (6) 目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けること。
- (7) 外用にのみ使用し、内服しないこと。

【成分・分量】

エタノール（ C_2H_6O :46.07） 76.9～81.4vol%

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 使用時は、薬液により変質、変色等をおこすおそれがあるので液だれ、こぼれには注意すること。
- (4) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (5) 火気に近づけないこと。

【お問合せ先】

日興製薬株式会社 品質管理部
岐阜県羽島市上中町一色467-1
電話 058-398-2576

副作用被害救済制度のお問合せ先

（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

火気厳禁

第4類

アルコール類

水溶性

危険等級Ⅱ



4 987291 815017



容 器：PE
キャップ：PP

製造番号

使用期限