

NIKKO

第3類医薬品

日本薬局方

消毒用エタノール

外皮用殺菌消毒剤

500mL



日興製薬株式会社
岐阜県羽島市江吉良町1593

製造販売元

使用に際してこの説明文をよくお読み下さい。
また、必要なときに読めるように大切に保管して下さい。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)
次の部位には使用しないこと。
粘膜(口唇等)、目の周囲

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 患部が広範囲の人。
 - (4) 深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用後、次の症状があらわされた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効能・効果】

創傷面の殺菌・消毒

【用法・用量】

本液を脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部に軽く塗る。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないこと。
- (3) 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。
- (4) 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
- (5) 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用せること。

(6) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、直ちに眼科医の診療を受けること。
(7) 外用にのみ使用し、内服しないこと。

【成分・分量】

エタノール (C_2H_6O) 76.9~81.4vol%

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 使用時は、薬液により変質、変色等を起こすおそれがあるので液だれ、こぼれには注意すること。
- (4) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (5) 火気に近づけないこと。

【お問合せ先】

日興製薬株式会社 信頼性保証部
岐阜県羽島市上中町一色467-1 TEL. 058-398-2576

副作用被害救済制度のお問合せ先

(独) 医薬品医療機器総合機構
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
TEL. 0120-149-931 (フリーダイヤル)

火気厳禁

第4類

アルコール類

水溶性

危険等級Ⅱ



4 987291 815017



製造番号

使用期限

容 器 : PE
キャップ : PP