

あかぎれ用薬

指定医薬部外品

## グリセリンP「ケンエ」

Glycerin P「Kenei」

500mL



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号  
電話番号 06(6231)5626

ひび、あかぎれに

使用に際しては、説明書きをよく読んでください。

グリセリンP「ケンエ」

**!** 使用上の注意**してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないでください  
湿潤やただれのひどい人。**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください

使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発赤、刺激感

**【効能効果】**

(外用) ひび、あかぎれ

**【用法用量】**

(外用) 脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部に軽く塗ってください。

製造  
番号  
使用  
期限**〈用法用量に関連する注意〉**

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

(4) 外用にのみ使用してください。

**【成分分量】**

1 mL中 グリセリン 1 mL含有。

[グリセリン(C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>O<sub>3</sub>) 84.0～87.0%を含有。]**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

**〈貯法〉**

気密容器。室温保存。

キャップ：PP  
バックシン：PE,PP  
ボトル：PE

グリセリンP「ケンエ」