

チェリメント®AG軟膏

第3類医薬品

- ◆ チェリメントAG軟膏は、ひび・あかぎれなどによる皮膚の荒れや血行不良により起こるしもやけ・皮膚のかゆみを改善するよう考え出された軟膏です。
- ◆ チェリメントAG軟膏中のアラントインは新しい皮膚の形成を助け、荒れた皮膚を回復させるように働きます。グリチルレチン酸はひび・あかぎれなどの皮膚の炎症を鎮め、ジフェンヒドラミン塩酸塩、dl-カンフル、l-メントールは皮膚のかゆみを抑えます。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 湿潤やただれのひどい人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるので、医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

ひび、しもやけ、あかぎれ、かゆみ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗擦して下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (4) 外用にのみ使用すること。
- (5) 患部を清潔にしてから使用すること。

成分・分量

本剤100g中

dl-カ　ン　フ　ル	7 g
l　ー　メ　ン　ト　ー　ル	1 g
ジフェンヒドラミン塩酸塩	0.5g
ア　ラ　ン　ト　イ　ン	2 g
グ　リ　チ　ル　レ　チ　ン　酸	0.3g

添加物としてシコンエキス、白色ワセリンを含有する。

- ・本剤は赤紫色で、特異な芳香がある軟膏剤です。
- ・本剤は天然の生薬も原料としていますので、多少色調の異なることがあります。効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
【40℃以上の高温の場所を避けること。晴天の日は自動車内が高温になるので放置しないこと。】
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

使用ポイント

ご使用に当たっては下記の事項を参考に塗擦するようにして下さい。

ひび、あかざれ かゆみ	軟膏をうすくすり込んで下さい。
しもやけ	皮膚表面がしっかりしている場合は、うすくすり込んで下さい。皮膚の荒れがひどい場合には、弊社の創傷性皮膚疾患用薬赤色ワグラス軟膏をご使用下さい。

薬と養生

チェリメントAG軟膏はあなたの症状を考えて正しく使用することが大切です。

また、気持ちの持ち方(気の養生)や食生活(食の養生)に注意することも、病気を治すためには大事なことです。

あなたの病気を早く治すため、お薬の使用に際しては、医師やホノミ漢方会々員の薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地 1