

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

にきび治療薬

エスカメルは…

エスカメル

- にきびの原因菌にすぐれた殺菌作用をあらわします。
- 患部を乾燥し、にきびの治りを早めます。
- 肌色で目立ちません。




使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。
- (5) 湿潤やただれのひどい人。
- (6) 深い傷やひどいやけどの人。



2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

【効 能】

尋常性痤瘡(にきび)

【用法・用量】

患部を清浄後、1日1回塗布します。特に脂性の方は、2～3回塗布します。



〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 使用に先だって少量をひじの内側に塗り、一晚そのままにしておいてください。翌朝、塗った箇所には過敏症状(発疹・発赤、かゆみ等)があらわれた場合には使用しないでください。
- (2) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。
- (6) 本剤を塗布後、患部をこすらないようにしてください。
- (7) 本剤の使用により、皮膚が多少乾燥したり、赤みをおびたりすることがあります。そのような時は使用を一時中止してください。再び使用する時は間隔をあけてから使用してください。

〔成分・分量と働き〕

成 分	分 量	働 き
イオウ	8%	角質を軟らかくします。また、すぐれた殺菌作用でにきびの悪化を防ぎます。
レゾルシン	2%	角質を取り除いたり、細菌による化膿を防ぎます。

添加物として、ベントナイト、酸化チタン、プロピレングリコール、アルコール、水酸化K、酸化鉄、三二酸化鉄、香料を含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。



上手な使い方

ていねいに洗顔後、エスカメルを指先にとり、にきびの上だけにのせるように塗ります。この時、強くすりこんだり、患部以外の部分までのばさないようにしてください。

次のようなことがらに心がけてください

1. よく洗顔して、常に清潔に保つようにしてください。
2. 患部を汚れた手などで、さわらないようにしてください。また、手で患部をこすったり、圧迫したりして刺激を与えないようにしてください。
3. チョコレート、キャンディ、ピーナッツなどの糖分や脂肪を多く含んだ食べものはなるべくひかえてください。
4. 油性化粧品の使用はなるべくひかえてください。
5. 髪の毛や整髪料が常時顔に触れないようにしてください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号