

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

## アトピー性皮膚炎、急性・慢性湿疹に **ドルマイコーチ軟膏** (抗菌性物質+ヒドロコルチゾン製剤)

### 〔特 徴〕

ドルマイコーチ軟膏は抗菌力を有する二つの抗生物質、バシトラシンとフラジオマイシンを配合し、さらに痒みと炎症を抑えるヒドロコルチゾンを加え、細菌感染症及び炎症性の皮膚疾患に効果を発揮する皮膚疾患治療薬です。

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください  
本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください  
(1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等。  
(2) 湿潤、ただれのひどい患部。  
(3) 深い傷、ひどいやけどの患部。
3. 長期連用しないでください

#### 相談すること



1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。  
(3) 薬や化粧品等によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(4) 患部が広範囲の人。  
(5) 鼻腔等の粘膜に病変のある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください  
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位   | 症 状                               |
|--------|-----------------------------------|
| 皮膚     | 発疹・発赤、かゆみ、かぶれ                     |
| 皮膚(患部) | みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感、発疹 |

\* まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称              | 症 状                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| ショック<br>(アナフィラキシー) | 使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。 |

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

### 〔効能・効果〕

アトピー性皮膚炎、急性・慢性湿疹(くさ、ただれ)、小児湿疹、脂漏性湿疹、貨幣状湿疹、食餌性湿疹、接触性皮膚炎(かぶれ)、アレルギー性皮膚炎、神経性皮膚炎、バシトラシン・フラジオマイシン感受性菌による膿疱疹、膿痂疹(とびひ)、伝染性皮膚炎、化膿性皮膚炎、ピダール氏苔癬、肛門痒症、外陰部痒症、固定尋麻疹、薬物性皮膚炎

## 〔用法・用量〕

炎症が消失するまで1日2～3回患部に塗布してください。

### 〔用法や用量に関する注意〕

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 定められた用法を守ってください。
- (5) 本剤の基剤として使用されている油脂性成分は、コンドーム等の避妊用ラテックスゴム製品の品質を劣化、破損する可能性があるため、これらとの接触を避けてください。

## 〔成分〕 1g中

| 成 分        | 分 量        | はたらき                                                                                                                                  |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| バシトラシン     | 250単位      | 菌種 <i>Bacillus subtilis</i> var. Tracy の培養液より抽出された白色から淡褐色の粉末です。<br>ペニシリンと近似の抗菌スペクトルを有し、大部分のグラム陽性菌と、陰性菌の一部に奏効します。                      |
| 硫酸フラジオマイシン | 3.5mg (力価) | <i>Streptomyces fradiae</i> の産生する抗菌性物質でWaksmanらによって発見されたNeomycinと同一のもので、その抗菌作用はグラム陽性・陰性菌、放線菌、原虫と広く、混合感染及び他の抗生物質による耐性感染症に対しても効果を発揮します。 |
| 酢酸ヒドロコルチゾン | 2.5mg      | 副腎皮質ホルモン剤で、皮膚疾患治療薬として、止痒作用、消炎作用、抗アレルギー作用があります。                                                                                        |

添加物として、白色ワセリン、流動パラフィン及び精製ラノリンを含有する。

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

### お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室

TEL 03-3661-2080 (ダイヤルイン)

月～金曜日 9:00～17:00 (祝祭日を除く)



製造販売元

**ゼリア新薬工業株式会社**

東京都中央区日本橋小舟町10-11



KB B06

ドルマイコーチ軟膏