


この添付文書は、本剤のご使用前に必ずお読みください。また、必要なとき読めるよう大切に保管してください。




かくしながら治療する ピンプリットN にきび治療薬

肌色
タイプ

にきびについて


皮脂の分泌が活発になるとともに、毛穴周辺の角質層（皮膚の一番表面部分）が厚くなって毛穴がつまることにより、にきびができます。毛穴がつまった後、炎症がおこって赤くはれたり、膿がたまって化膿することがあるため、早めに治療することが必要です。

（にきびの種類とその状態）



特長

(1) にきびを3ステップの作用で治療



(2) オイルフリー

油分を全く含まないので、べたつかず、さっぱりした使用感です。

(3) 無香料

(4) 患部がかさつきにくい使用感

湿潤剤として濃グリセリンを配合しています。

(5) 肌色タイプ

患部をかくしながら治療できる肌色タイプです。

△使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 患部が広範囲の人
- (5) 湿潤やただれのひどい人
- (6) 深い傷やひどいやけどの人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

適応症

にきび

用法・用量

1日1～3回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

成分・分量

(1g中)

成分	含量	作用
イオウ	40mg	角質を軟らかくし、アクネ菌などの細菌をおさえる作用があります。
レゾルシン	20mg	殺菌作用により、細菌感染による化膿を防ぎます。
酸化亜鉛	20mg	患部を乾燥させ保護します。
グリチルレチン酸	3mg	炎症をやわらげ、赤みをしずめます。

添加物として、グラニオール、エタノール、グリセリン、1,3-ブチレングリコール、マクロゴール、タルク、カオリン、三二酸化鉄、酸化鉄、乳酸、ベントナイトを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。
- (5) ご使用後は、チューブの口元をきれいにふいた後、しっかりキャップをしめて保管してください。

にきび治療のポイント

にきびを早く治療するために、生活面でも次のことに注意しましょう。

- ① 顔、背中、胸などの肌はもちろんですが、髪の毛や直接肌に触れる下着、タオル類も常に清潔に保ちましょう。
- ② 脂肪、糖類を控え、肌のためのビタミンB₂・B₆、カロテンなどを補給できるバランスの良い食生活を心がけましょう。
- ③ 自律神経のバランスを整えるため、十分な睡眠、適度な運動、ストレスの少ない生活を心がけましょう。
- ④ にきびの部分に髪がかからないよう、ヘアスタイルに工夫し、にきびを手でさわらないよう注意しましょう。

【包装】

18g

SHISEIDO

お問い合わせ先

本品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

資生堂薬品株式会社 お客様窓口

電話 03-3573-6673

受付時間 9:30～17:00 (土、日、祝日を除く)

発売元 資生堂薬品株式会社
東京都中央区銀座7-5-5

製造販売元 株式会社 資生堂
東京都中央区銀座7-5-5

pim-N06016