

【化膿性疾患用生薬製剤】

この添付文書は、お薬とともに保管し、
服用の際には、必ずお読み下さい。

ワグラス[®] D錠

- ◆ ワグラスD錠は、^{はれもの}腫物(できもの・おでき)やリンパ腺炎といった化膿・炎症疾患を改善するために考え出された生薬製剤です。
- ◆ ワグラスD錠中のキキョウ・キジツ・シヤクヤクは排膿を促し炎症を鎮め、ショウキョウ・カンゾウ・タイソウは、化膿・炎症疾患の病状回復を早めるように働きます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
むくみ
 - (6) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合
- 長期連用する場合には、医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること
- 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるので、医師又は薬剤師に相談すること

効能・効果

化膿性疾患(フルンケル^{a)}、カルブンケル^{b)}、^{はれもの}腫物、るいれき^{c)}、リンパ腺炎、蓄膿症、^{し そうのうろう}歯槽膿漏、中耳炎、乳腺炎)の改善又は回復促進

a)フルンケル：患部が狭いおできのことを示します。毛孔から化膿球菌が侵入し、炎症を起こしている状態です。

b)カルブンケル：フルンケルが集まって患部が広がったおできのことを示します。

c)るいれき：結核性の頸部のリンパ節(腺)炎のことを示します。

用法・用量

次の量を随時^{注)}、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「随時服用」とは食前・食間(食後2~3時間)・食後のいつ服用してもよいことを指しますが、胃腸の弱い方は食後の服用がよいでしょう。

年 齢	1回量	1日服用回数
大 人	5錠	3回
15歳未満 12歳迄	4～3錠	
12歳未満 7歳迄	3～2錠	
7歳未満 5歳迄	2～1錠	
5歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本剤8160錠(1632g)中

カンゾウ 1200g	シャクヤク 10g	水製エキス …240g	カンゾウ末 480g	ショウキョウ末 112g
キキョウ 640g	ショウキョウ 10g		シャクヤク末 480g	キ ジ ツ末 320g
キ ジ ツ 10g	タイソウ 560g			

- ・本剤は淡灰褐色で、特異なおいを有し、味は初め甘く後少し苦い素錠です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 分包品において1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

薬と養生

ワグラスD錠は生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考慮して正しく服用することが大切です。

また、気持ちの持ち方(気の養生)や食生活(食の養生)に注意することも、病気を治すためには大事なことです。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、生薬製剤や養生方法のことをご理解いただいている医師、歯科医師やホノミ漢方会々員の薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剂盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元



剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田515番地1