

効能・効果

あせも、ただれ、かぶれ、じんましん、かゆみ、皮膚炎、湿疹、虫さされ

用法・用量

1日数回、患部に適量を噴射してください

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (2) 目に入らないように注意すること
万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (3) 外用にのみ使用すること
- (4) パウダー入りなので、使用前によく振ること
- (5) 患部まで約10cmの距離で噴射すること
- (6) 凍傷などの恐れがあるので、同じ箇所連続して1秒以上噴射しないこと
- (7) 定められた用法・用量を厳守すること
- (8) 顔面に使用する場合は、直接噴射しないこと

成分・分量 100g中

成分	分量	はたらき
ジフェニヒドラミン	0.1g	かゆみの発生を抑制
リドカイン	0.2g	局所麻酔作用で、かゆみを緩和
ベンゼトニウム塩化物	0.01g	殺菌作用で、化膿を防止
酸化亜鉛	1.0g	患部を乾燥し、治癒促進

添加物として、ステアリン酸Mg、ミリスチン酸イソプロピル、トウモロコシデンプン、LPGを含有する

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

発売元

小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)

☎0120-5884-01

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元

小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところにキャップをしっかりとめて保管すること
 - (2) 小児の手の届かないところに保管すること
 - (3) 火気に近づけないこと
- **車内や直射日光の当たる場所、暖房器具(ストーブ、ファンヒーターなど)の付近などには、温度が上がり破裂する危険があるため置かないこと**
 - 温度が40℃以上になる所に置かないこと
 - 水まわりや湿気の多い場所では缶がサビて穴があき、破裂することがあるので置かないこと

使用前によく振ること



横向きにして使用しないこと

内容量 40g

火気と高温に注意

- 捨てるときには、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押してガスを抜き、捨てること

高圧ガス: LPG



副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

使用に際して、この説明書を必ずお読みください

また必要なときに読めるよう大切に保管してください

使用期限(パッケージ底面および缶底に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

販売名:アセモア **第2類医薬品**

(Prickly Heat Powder Spray) 外用湿疹・皮膚炎用薬

特徴

- 1 有効成分がかゆみをすばやく抑え、あせもの炎症を鎮めます**
- 2 吸湿性に優れたパウダーが湿り感を取り除き肌をサラサラにします**
- 3 スプレー式なので手が汚れず衛生的です**

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと
目や目の周囲、粘膜など



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 湿潤やただれのひどい人
 - (4) 末梢血行障害がある、またはあると思われる人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること