

# アセモア

## パウダースプレー

かゆみにすばやく効く

# あせも治療薬



非ステロイド  
無香料  
無着色

お子様にも



40g



外用湿疹・皮ふ炎用薬

第2類医薬品

使用に際して、この説明書を必ずお読みください

Prickly Heat Powder Spray

### ⚠ 使用上の注意

使用期限(缶底に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

**してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 次の部位には使用しないこと 目や目の周囲、粘膜等

**相談すること** 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 湿潤やただれのひどい人 (4) 末梢血行障害がある、又はあると思われる人 2. 使用後、

右の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状          |
|------|--------------|
| 皮ふ   | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**効能・効果** あせも、ただれ、かぶれ、じんましん、かゆみ、皮ふ炎、湿疹、虫さされ

**用法・用量** 1日数回、患部に適量を噴射してください <用法・用量に関連する注意> (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること (3) 外用にのみ使用すること (4) **パウダー入りなので、使用前によく振ること** (5) 患部まで約10cmの距離で噴射すること (6) 凍傷等の恐れがあるので、同じ箇所に連続して1秒以上噴射しないこと (7) 用法・用量を厳守すること (8) 顔面に使用の場合は、直接噴射しないこと **成分・分量** 100g 中 ジフェンヒドラミン 0.1g、リドカイン 0.2g、ベンゼトニウム塩化物 0.01g、酸化亜鉛 1.0g 添加物として、ステアリン酸Mg、ミリスチン酸イソプロピル、トウモロコシデンプン、LPGを含有する

**保管及び取扱い上の注意** (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にキャップをしっかりとめて保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 火気に近づけないこと ● **車内や直射日光の当たる場所、暖房器具(ストーブ、ファンヒーター等)の付近等には、温度が上がり破裂する危険があるため置かないこと**

## 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

1. 炎や火気の近くで使用しないこと。
2. 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
3. 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
4. 火の中に入れないこと。
5. 使い切って捨てること。

高圧ガス：LPG

製品のお問合せはお買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

●捨てるときには、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押してガスを抜き、捨てること

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

プラスチック・キャップ、外装フィルム ㊞

MADE IN JAPAN 製造番号、使用期限は缶底に記載