

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。

第3類医薬品**軟膏とパウダーを兼ねた****アセモスチール®****あせも、ただれに**

®登録商標

アセモスチールはバレイショデンプン（32%）、酸化亜鉛（32%）が配合されているため塗布後パウダー状になり、湿潤した患部を乾燥させサラサラ感を与えます。アセモスチールに配合されている酸化亜鉛が皮ふを保護し、ジフェンヒドラミン、アミノ安息香酸エチルがかゆみ、痛み等の症状を緩和します。軟膏とパウダーの特徴を合せもつあせもやただれに適した軟膏剤です。

⚠ 使用上の注意**相談すること****1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること**

- ① 医師の治療を受けている人。
- ② 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- ③ 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ④ 湿潤やただれのひどい人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- ① 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- ② 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合。

<効能・効果>

あせも、ただれ、かぶれ、かゆみ、皮膚炎、じんましん。

<用法・用量>

1日2～3回適量を患部に塗布してください。

用法・用量に関する注意

- ① 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- ② 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- ③ 外用にのみ使用してください。

<成分・分量>

軟膏100g中

成 分	分 量	はたらき
ジフェンヒドラミン	1.0g	かゆみ等のアレルギー症状を緩和します。
アミノ安息香酸エチル	2.0g	痛み、かゆみ等を鎮めます。
酸化亜鉛	32.0g	皮ふを保護し、炎症を抑えます。

添加物：パラベン、フェノール、l-メントール、マクロゴール、バレイシヨデン
ブン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油

保管及び取り扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)
4. 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は次の所にお問い合わせください。
大昭製薬株式会社 おくすり相談室
電話 0748-88-4181
受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

製 造 販 売 元

 **大昭製薬株式会社**
DAISHO

滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168