

使用に際し、この説明書を必ず読むこと。
また、必要なとき読めるように大切に保管すること。

消炎外用薬

あせも、かぶれ、ただれに

アネミン[®]ローション

製品の特徴

アネミンローションは、お肌と同じ弱酸性でべたつきの少ない無色透明のローションです。皮ふにおきた炎症を鎮める塩酸ジフェンヒドラミンと皮ふ表面の雑菌を殺菌消毒する塩化ベンザルコニウム液を配合しています。これらの成分のはたらきにより、あせも、かぶれ、ただれなどの皮ふ症状の改善に効果的です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)
次の部位には使用しないこと。
目の周囲、粘膜（例えば口唇、鼻腔内など）。



相談すること

- 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 本人または家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 湿潤やかぶれのひどい人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書をもって医師または薬剤師に相談すること。
 - 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

成分分量 100mL中

成 分	分量	は た ら き
塩酸ジフェンヒドラミン	1000mg	抗ヒスタミン剤で炎症やかゆみを鎮めます。
塩化ベンザルコニウム液(10%)	1mL	刺激の少ない殺菌消毒作用で皮ふ表面の雑菌をのぞきます。

添加物としてグリセリン、ラウロマクロゴール、クエン酸、香料を含有する。

用法用量

適量を取り、患部に塗布または塗擦する。

（用法用量に関連する注意）

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
2. 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
3. 外用にのみ使用すること。

使用方法

肌に直接もしくは手や脱脂綿などによって使用してください。

1.あける



ノズル部を
○の位置に合わせる

2.おす



上向きにして、
容器の中心部を押すと
薬液の泡がでます

注意



振らないこと。上向きで使用。

効能効果

あせも、ただれ、かぶれ、じんましん、虫さされ。

保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手のとどかない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
4. 表示の使用期限を過ぎたものは使用しないこと。

【問い合わせ先】

1. 購入した薬局・薬店
2. 日水製薬株式会社 お客様相談窓口 電話：03-3837-0987
受付時間：午前10時～12時、午後1時～5時
（土・日・祝日を除く）



製造販売元
日水製薬株式会社
東京都台東区上野3-23-9