

第2類医薬品

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限を過ぎた製品は使用しないこと



販売名: アンメルシン 1%ヨコヨコ

External Anti-Inflammatory/
Analgesic Containing Indometacin

外用鎮痛消炎剤

特徴

1. 腰、肩、ひざの痛みにも優れた効き目も發揮する塗り薬です
2. 有効成分インドメタシンが、皮ふから浸透し関節の痛みを和らげます
3. 患部に直接塗れるポルトタイプなので、手を汚さず手軽に使えます

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2) ぜんそくを起したことがある人
(3) 11才未満の小児
2. 次の部位には使用しないこと
(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口
(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部
3. 長期運用しないこと

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、かぶれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

■ 成分・分量 100mL 中 ■

インドメタシン 1000mg
L-メントール 3000mg
添加物として、グリチルレチン酸、ベンジルアルコール、ラウロマグロコラー、炭酸プロピレン、クエン酸、PH調整剤、BHT、ハアセチルシロ糖、エタノールを含有する

■ 効能・効果 ■

関節痛、腰痛、打撲、捻挫、筋肉痛、腫瘍炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、肩こりに伴う肩の痛み

■ 用法・用量 ■

1日4回を限度として患部に適量塗布してください

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 11才以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (2) 目に入らないように注意すること
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (3) 外用にのみ使用すること
- (4) 1週間あたり50mLを超えて使用しないこと
● 塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないこと
● 皮ふの特に弱い人は、同じ所に続けて使用しないこと
● 同じ部位に他の外用剤を併用しないこと

■ 保管及び取扱い上の注意 ■

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所(冷暗所)にキャップをしっかりとめて立てて保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 火気に近づけないこと(エタノール含有物)
● キャップをしっかりとめないこと液がもれることがある
● プラスチック製品(眼鏡わく、くし、便座等)、化繊の衣類、木材(塗料塗家具、床等)、皮革等に液がつくと損耗したり、シミになることがあるので注意すること
● 衣類に付着した場合には、各衣類の洗濯表示に従って、すみやかに洗うこと

🔥 火気厳禁

第二石油類 危険等級Ⅲ
エタノール含有物 水溶性

製品のお問合せは、お買い求めのお店
又はお客様相談室にお願いたします

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

🏷️ 控除対象

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01
9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN