

第2類医薬品

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限を過ぎた製品は使用しないで

販売名: アンメルシン 1%ヨコヨコ

External Anti-Inflammatory/
Analgesic Containing Indometacin **外用鎮痛消炎剤**

▲ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を
起こしたことがある人
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人
- (3) 11才未満の小児

2. 次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部

3. 長期連用しないこと

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師
又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性が
あるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、
薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------------------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、 熱感、乾燥感、かぶれ |

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は
使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談すること

製品のお問合せは、お買い求めのお店
又はお客様相談室にお問い合わせください

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社

〒567-0057 大阪府茨木市墨川1-30-3

税 控除 対象

成分・分量 100mL中

インドメタシン 1000mg
L-メントール 3000mg
添加物として、グリチルリチン酸、ベンジルアル
コール、ラウロマクロゴール、炭酸プロピレン、
クエン酸、pH調整剤、BHT、ハアセチルシロ糖、
エタノールを含有する

効能・効果

関節痛、腰痛、打撲、捻挫、筋肉痛、腱鞘炎(手・
手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、肩こりに
伴う肩の痛み

用法・用量

1日4回を限度として患部に適量塗布してください


〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 11才以上の小児に使用させる場合には、保護
者の指導監督のもとに使用させること
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目
に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を
受けること
- (3) 外用にのみ使用すること
- (4) 1週間あたり50mLを超えて使用しないこと
 - 塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪い
もので覆わないこと
 - 皮ふの特に弱い人は、同じ所に続けて使用し
ないこと
 - 同じ部位に他の外用剤を併用しないこと

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所
(冷暗所) にキャップをしっかりとめて立てて
保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと (誤用の原因に
なったり品質が変わる)
- (4) 火気に近づけないこと(エタノール含有物)
 - キャップをしっかりとめないで液がもれる
ことがある
 - プラスチック製品(眼鏡わく、くし、便座等)、
化繊の衣類、木材(塗料塗家具、床等)、皮革等に
液がつくと損耗したり、シミになることがある
ので注意すること
 - 衣類に付着した場合には、各衣類の洗濯表示に
従って、すみやかに洗うこと

火気厳禁 第二石油類 危険等級Ⅲ
エタノール含有物 水溶性



特 徴

1. 腰、肩、ひざの痛みに優れた
効き目を発揮する塗り薬です
2. ラバー面積が4倍(当社比)
手を汚さず、効き目成分を
一度でたっぷり塗れます
3. 有効成分インドメタシンが
皮ふからすばやく浸透し、
関節の痛みを和らげます

(原寸大)