

P

P

## 〔効能効果〕

- 虫さされ、虫さされによるかゆみ
- 気付け

## 〔用法用量〕

5～10倍に希釈して患部に軽く塗布してください。  
気付けには、かるく臭いをかがせてください。

## 〈用法用量に関連する注意〉

- (1)用法用量を厳守してください。
- (2)局所刺激作用があるので、患部に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないでください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診察を受けてください。
- (5)外用にのみ使用してください。

## 〔成分分量〕 1mL中

日局アンモニア水 1mL含有。

〔アンモニア (NH<sub>3</sub>) 9.5～10.5 w/v%を含有。〕

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所（30℃以下）に密栓して保管してください。（揮発性の有効成分を含有しています。）
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

## 〔貯法〕

気密容器。30℃以下で保存。

## 虫さされ用薬

日本薬局方

## アンモニア水

Ammonia Water

500mL

医薬品

 健栄製薬株式会社  
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号  
電話番号 06(6231)5626

使用に際しては、説明書きをよく読んで下さい。

## ⚠ 使用上の注意

## してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜（口唇等）
- (2)傷口、ただれ、かぶれ

## 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1)本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (2)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3)湿潤やただれのひどい人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください  
使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発赤、はれ、灼熱感



4



キャップ：PP  
パッキン：PE,PP  
中 栓：PE  
ボトル：PE

~30°

製造  
番号  
使用  
期限