

虫さされ用薬

TRADE



MARK

日本薬局方

アンモニア水

「タイセイ」P

Ammonia Water

500mL

製造販売元
大成薬品工業株式会社
福岡県筑後市大字熊野字屋敷998-1

第3類医薬品

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。
また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり
副作用が起こりやすくなる)

・次の部位には使用しないこと。

- 1) 口、唇等の粘膜の部分、目や目のまわり。
- 2) 傷のある所(虫さされによる刺激は除く)。
- 3) ただれたり、かぶれている所。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること。
 - 1) 医師の治療を受けている人。
 - 2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
 - 3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 4) 湿潤やただれのひどい人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談すること。

1) 使用後に、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合。

成分・分量

アンモニア(NH₃) 9.5～10.5w/v%を含有する。



キャップ:PP 本体:ガラス

使用期限

製造番号

アンモニア水「タイセイ」P

効能・効果

虫さされ、虫さされによるかゆみ、気付け

用法・用量

5～10倍に希釈して患部に軽く塗る。

気付けには、かるく臭いをかがせる。

＜用法用量に関連する注意＞

- 1) 局所刺激作用があるので、患部に軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないこと。
- 2) 小児に使用する場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用すること。
- 3) 目に入らないように注意すること、万一、目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けること。
- 4) 外用にのみ使用すること。

保管および取り扱い上の注意

- 1) 直射日光の当たらない涼しい場所(30℃以下)に保管すること。
- 2) 揮発性があるので、使用後は、密栓すること。
- 3) 小児の手が届かないところに保管すること。
- 4) 他の容器にいれかえないこと。
(誤用の原因になったり、品質が変わる。)

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、あるいは下記にお問い合わせください。
大成薬品工業株式会社 お客様相談室
電話：0942-53-4662 (代表)
9:00～17:00 (土日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



4 987297 304225